

Feuille d'exercices n°5 : Ensembles et applications

ECE3 Lycée Carnot

9 octobre 2009

Exercice 1 (*)

Dans l'ensemble des entiers naturels, on considère les trois sous-ensembles $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$; $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et $C = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Déterminer les ensembles suivants : \overline{A} ; $B \setminus A$; $A \cup B \cup C$; $\overline{C} \cap \overline{B}$; $A \cup (B \cap C)$.

Exercice 2 (* à **)

On se place dans \mathbb{R} et on considère les ensembles $A = [4; 12]$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| \leq 5\}$, et $C = \mathbb{N}$. Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants : $A \cup B$; $A \cap C$; $\mathbb{R} \setminus B$; $A \cap \overline{C}$; $(A \cup B) \cap C$; $A \cup (B \cap C)$; $\overline{A} \cap (\overline{B} \cup C)$.

Exercice 3 (* si vous n'avez pas tout oublié sur les quadrilatères)

Cet exercice vous rappellera de (bons ?) souvenirs de géométrie du collège. On note Q l'ensemble du quadrilatère du plan, A l'ensemble des quadrilatères ayant un angle droit, P l'ensemble des parallélogrammes, T l'ensemble des trapèzes, C l'ensemble des carrés, R l'ensemble des rectangles, et L l'ensemble des losanges.

Parmi tous ces ensembles, déterminer qui est inclus dans qui, puis déterminer ce que valent les ensembles $A \cap L$, $A \cap P$ et $L \cap R$.

Exercice 4 (**)

Soient A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E . Montrer que $A = B \Leftrightarrow A \cap B = A \cup B$.

Exercice 5 (***)

Montrer que, si A , B et C sont trois sous-ensembles d'un même ensemble E , $(A \setminus B) \cup (B \setminus C) \cup (C \setminus A) = (A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$.

Exercice 6 (***)

Soient A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E . On définit une nouvelle opération \star de la façon suivante : $A \star B = \overline{A \cap B}$. Exprimer le plus simplement possible les ensembles suivants : $A \star A$; $(A \star A) \star (B \star B)$; $(A \star B) \star (A \star B)$.

Exercice 7 (**)

L'application $x \mapsto 2x$ est-elle injective, surjective, bijective de \mathbb{R} dans \mathbb{R} ? Et de \mathbb{N} dans \mathbb{N} ? Et de \mathbb{Q} dans \mathbb{Q} ?

Exercice 8 (**)

Déterminer pour chacune des applications suivantes si elle est injective, surjective ou bijective (ou rien du tout!) de \mathbb{N} dans \mathbb{N} :

- $f_1(n) = n + 5$
- $f_2(n) = n^2$
- $f_3(n) = n + 1$ si n est pair, et $f_3(n) = n - 1$ si n est impair
- $f_4(n) = \text{Ent}\left(\frac{n}{3}\right)$
- $f_5(n) = |n - 10|$

Exercice 9 (* pour la première moitié, ** pour la deuxième)

Soit f la fonction inverse. Déterminer $f([2; 4])$; $f(]0; 2])$; $f([-1; 5])$, ainsi que les images réciproques de ces trois intervalles par f .

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 4}$. Déterminer son ensemble de définition et étudier rapidement g (vous avez le droit de dériver...). Déterminer $g([-1; 1])$; $g([-6; -3])$; $g^{-1}(] - \infty; 1])$; $g^{-1}([0; 1])$.

Exercice 10 (**)

Démontrer qu'une fonction strictement croissante est nécessairement injective. Déterminer les solutions de l'équation $x + e^x = 1$.

Exercice 11 (***)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$.

1. Soit $y \in \mathbb{R}$. Déterminer en fonction de y le nombre d'antécédents de y et leur valeur quand il y en a.
2. L'application f est-elle injective? Surjective? Bijective?
3. Montrer que $\forall x \in [-1; 1]$, $f(x) \in [-1; 1]$. La restriction de $f : [-1; 1] \rightarrow [-1; 1]$ est-elle bijective?

Exercice 12 (**)

On définit sur \mathbb{R} une application f par $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$. Déterminer si d est injective, surjective, bijective.

Exercice 13 (**)

Soit $f : E \rightarrow E$ une application telle que $f \circ f \circ f = id_E$. Montrer que f est bijective et déterminer sa réciproque.

Exercice 14 (****)

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application injective telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(n) \leq n$. Montrer qu'on a en fait $f = id_{\mathbb{N}}$.