AP n°2 : corrigé

PTSI B Lycée Eiffel

18 septembre 2020

Quelques équations et inéquations.

1. Pour que le membre de droite ait un sens, on doit avoir $x \leq 1$, on va donc résoudre sur l'intervalle $] -\infty, 1]$. Il faut également enlever la valeur $x = -1$, qui est une valeur interdite pour le membre de gauche. Par ailleurs, si $x < -1$, ce même membre de gauche est strictement négatif, et l'inégalité est alors nécessairement vérifiée, l'intervalle $] -\infty, -1[$ est donc inclus dans l'ensemble des solutions de notre inéquation. Si $x \in] -1, 1]$, tout est positif à gauche comme à droite, on peut élever au carré pour obtenir l'inéquation équivalente $\frac{1}{x^2 + 2x + 1} \leq 1 - x$, soit $1 \leq (x^2 + 2x + 1)(1 - x) = -x^3 - x^2 + x + 1$, ce qui donne donc $x^3 + x^2 - x \leq 0$. Le membre de gauche se factorise sous la forme $x(x^2 + x - 1)$, et la parenthèse a pour discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5$, et s'annule en $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$, et en $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. On en déduit le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	$\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$	0	$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$	$+\infty$
$x^3 + x^2 - x$	-	0	+	0	+

Dans l'intervalle qui nous concerne, on garde comme solutions les nombres dans l'intervalle $\left[0, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right]$. Finalement, $\mathcal{S} =] -\infty, -1[\cup \left[0, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}\right]$.

2. Bien sûr, on passe tout à gauche et on met au même dénominateur : $\frac{(2x + 3)(2x - 3) - 4x(x - 1)}{(x - 1)(2x - 3)} \leq 0$, soit en développant le numérateur (on ne touche pas au dénominateur, ça n'aurait aucun intérêt) $\frac{4x - 9}{(x - 1)(2x - 3)} \leq 0$. Il ne reste plus qu'à faire un beau tableau de signes :

x	1	$\frac{3}{2}$	$\frac{9}{4}$
$4x - 9$	-	-	+
$x - 1$	0	+	+
$2x - 3$	-	0	+
Q	-	+	+

On conclut : $\mathcal{S} =] -\infty, 1[\cup \left[\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right]$.

3. Il nous faudrait une racine évidente. Ne nous laissons pas impressionner par les coefficients, $x = 2$ convient très bien, puisque $2^3 - 39 \times 2 + 70 = 8 - 78 + 70 = 0$. On peut donc factoriser le membre de gauche de notre équation sous la forme $(x - 2)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$. Par identification des coefficients, on trouve successivement les conditions $a = 1$, puis $b - 2a = 0$ (attention, il n'y a pas de terme en x^2 dans le polynôme initial!) donc $b = 2$; $c - 2b = -39$, donc $c = -35$, ce qui est cohérent avec la dernière équation $-2c = 70$. Notre deuxième facteur $x^2 + 2x - 35$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 140 = 144$ (oh

tiens, un carré parfait), et admet pour racines $x_1 = \frac{-2-12}{2} = -7$ et $x_2 = \frac{-2+12}{2} = 5$.
 Bref, on conclut aisément : $\mathcal{S} = \{-7, 2, 5\}$.

4. Le membre de gauche a un sens si $x \neq -1$ et $x \neq 2$ (seules valeurs pour lesquelles les valeurs absolues dans les ln ne sont pas **strictement** positives toutes les deux). Le reste du temps, on peut simplement écrire que l'inéquation est équivalente à $\ln \left| \frac{x+1}{x-2} \right| \leq \ln(2)$, soit en passant à l'exponentielle $\left| \frac{x+1}{x-2} \right| \leq 2$. On se débarrasse des valeurs absolues : $-2 \leq \frac{x+1}{x-2} \leq 2$, puis on traite séparément les deux conditions : l'inéquation de gauche peut s'écrire $0 \leq \frac{x+1}{x-2} + 2 = \frac{3x-3}{x-2}$. Le quotient $\frac{3x-3}{x-2}$ est du même signe que le produit $(3x-3)(x-2)$, donc positif à l'extérieur de ses racines, sur les deux intervalles $] -\infty, 1]$ (auquel il faudra éventuellement enlever la valeur interdite -1) et $]2, +\infty[$ (là on enlève tout de suite la valeur interdite 2). L'autre inéquation s'écrit $\frac{x+1}{x-2} - 2 \leq 0$, soit $\frac{-x+5}{x-2} \leq 0$. Même raisonnement qu'auparavant, le quotient est du signe du produit, donc négatif à l'extérieur des racines (il y a un coefficient négatif devant x^2 ici), soit sur les intervalles $] -\infty, 2[$ et $]5, +\infty[$. Pour que les deux conditions soient vérifiées simultanément, on conserve $\mathcal{S} =] -\infty, 1] \setminus \{-1\} \cup [5, +\infty[$.
5. On va bien sûr commencer par poser $X = \ln(x)$ pour se ramer à l'inéquation du troisième degré $2X^3 - 5X^2 + 2X \leq 0$, qu'on peut bien sûr factoriser par X pour obtenir $X(2X^2 - 5X + 2) \leq 0$. Le trinôme $2X^2 - 5X + 2$ a pour discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$, et admet pour racines $X_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{5+3}{4} = 2$. Autrement dit, on doit étudier le signe du trinôme $X(X-2)(2X-1)$, qui est donné par le tableau suivant :

X	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2X^3 - 5X^2 + 2X$		$-$	$\emptyset$	$+$	$\emptyset$	$-$	$\emptyset$	$+$	

On en déduit que x est solution de notre inéquation si $X \in]-\infty, 0] \cup \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, soit en remontant le changement de variable $\mathcal{S} =]0, 1] \cup [\sqrt{e}, e^2]$.

Quelques études de fonctions.

- La fonction f_1 est définie sur $\mathbb{R}$ puisqu'on a toujours $x^2 + 1 > 0$. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $f_1'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - (x+1) \times \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{x^2+1 - x(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1-x}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}$. Cette dérivée s'annule pour $x = 1$, où la fonction f_1 admet un maximum de valeur $f(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$. Pour le calcul des limites, on procède comme souvent en factorisant numérateur et dénominateur, mais attention, il y a un petit piège : $f_1(x) = \frac{x(1+\frac{1}{x})}{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x^2})}}$. Attention au fait que $\sqrt{x^2} = |x|$.
 Si $x > 0$, on trouve donc $f_1(x) = \frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 1$, mais si $x < 0$, $f_1(x) = -\frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_1(x) = -1$. On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f_1		$\sqrt{2}$	1

Si on veut être plus précis, on peut noter que $f_1(0) = 1$, et que f_1 est du signe de $x + 1$, donc positive sur $[-1, +\infty[$. On conclut avec une première courbe :

- La fonction f_2 est définie sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$ (attention à la valeur d'annulation du logarithme!), elle est dérivable sur cet intervalle, de dérivée $f_2'(x) = \frac{\frac{\ln(x)}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{x}}{\ln^2(x)} = \frac{\ln(x) - 2}{2\sqrt{x}\ln^2(x)}$. Notre fonction est donc décroissante sur $]0, 1[$ et sur $]1, e^2[$, admet un maximum de valeur $f_2(e^2) = \frac{e}{2}$, et est décroissante sur $]e^2, +\infty[$. On obtient sans difficulté $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = 0$ (pas de forme indéterminée ici), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f_2(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f_2(x) = +\infty$, et enfin $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = +\infty$ par croissance comparée (pour les plus curieux, il n'y a pas d'asymptote oblique). On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	0	1	e^2	$+\infty$
f_2	0	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

- La fonction f_3 est définie si $e^x \neq 1$, donc sur $\mathbb{R}^*$. Elle y est dérivable, de dérivée $f_3'(x) = \frac{e^x(e^x - 1) - e^{2x}}{(e^x - 1)^2} = \frac{-e^x}{(e^x - 1)^2}$, donc elle est décroissante sur chacun de ses deux intervalles de définition. On obtient immédiatement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f_3(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f_3(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_3(x) = +\infty$. Seule la limite en $+\infty$ nécessite un petit calcul, on peut par exemple diviser numérateur et dénominateur par e^x pour écrire $f_3(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$, et en déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x) = 1$. Je ne me fatigue pas à faire un tableau de variations, voici la courbe :

- La fonction f_4 est définie si $1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} > 0$. Cela se produit sur $] -\infty, -1[\cup] 0, +\infty[$ (pas

besoin de tableau de signe, j'espère!). Elle y est dérivable, de dérivée $f_4'(x) = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} + 1 = 1 - \frac{1}{x(x+1)} = \frac{x^2 + x - 1}{x(x+1)}$. Le dénominateur de cette dérivée est toujours positif sur $\mathcal{D}_{f_4}$, et son numérateur a pour discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5$, il s'annule pour $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ (qui appartiennent tous les deux à notre domaine de définition). Les valeurs prises par la fonction aux deux extrema locaux n'ont vraiment aucun intérêt et sont particulièrement ignobles. Par contre, on peut constater que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$, ce qui prouve directement que la droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique à la courbe représentative de f_4 en $+\infty$ et en $-\infty$ (et accessoirement donne donc les limites de la fonction à l'infini). On calcule par ailleurs sans difficulté $\lim_{x \rightarrow -1} f_4(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f_4(x) = +\infty$, ce qui donne une courbe d'allure suivante :

- La fonction f_5 est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ (ce qui se trouve dans le $\ln$ est toujours strictement positif), de dérivée $f_5'(x) = \frac{e^x - 2e^{-x}}{e^x + 2e^{-x}}$. La dérivée est du signe de son numérateur, donc de $e^{2x} - 2$ (quitte à factoriser par e^{-x}). Or, $e^{2x} \geq 2$ si $x \geq \frac{\ln(2)}{2}$. On peut calculer $f_5\left(\frac{\ln(2)}{2}\right) = \ln\left(\sqrt{2} + \frac{2}{\sqrt{2}}\right) = \ln(2\sqrt{2}) = \frac{3}{2}\ln(2)$. De plus, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_5(x) = +\infty$ (pas de forme indéterminée). Avant de tracer la courbe, on peut s'intéresser aux asymptotes de f_5 : du côté de $+\infty$, on peut écrire $f_5(x) = \ln(e^x(1 + 2e^{-2x})) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$, avec le deuxième morceau qui a une limite nulle en $+\infty$. Cela suffit à prouver que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe de f_5 en $+\infty$. De même, la droite d'équation $y = -x + \ln(2)$ est asymptote en $-\infty$.

- La fonction f_6 est définie si $\ln(x) > 0$, donc sur $]1, +\infty[$ (et elle est positive sur $]e, +\infty[$). Pas la peine de calculer de dérivée, elle est évidemment croissante comme composée de fonctions croissantes. Pas de difficulté pour les limites non plus : $\lim_{x \rightarrow 1} f_6(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_6(x) = +\infty$. Il n'y a plus qu'à tracer une allure de courbe !

Un exercice type avec des valeurs absolues.

1. Il faut commencer par étudier le signe du trinôme $x^2 + x - 3$, qui a pour discriminant $\Delta = 1 + 12 = 13$ et admet les superbes racines $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}$. À l'extérieur de ces racines, on aura $f(x) = x^2 + x - 3 - x^2 + 3 = x$, donc tout simplement $f(x) = x$ sur chacun des deux intervalles $] - \infty, x_1]$ et $[x_2, +\infty[$. Au contraire, dans l'intervalle $[x_1, x_2]$, on a $f(x) = -x^2 - x + 3 - x^2 + 3 = -2x^2 - x + 6$.
2. Puisque 0 se trouve dans l'intervalle $[x_1, x_2]$ (c'est évident, $\sqrt{13} > 1$), l'équation $f(x) = 0$ ne peut pas avoir de solution sur $] - \infty, x_1]$ ($f(x)$ y sera négatif puisque $x \leq 0$ sur cet intervalle) ou sur $[x_2, +\infty[$ (où cette fois la fonction sera positive). Sur l'intervalle $[x_1, x_2]$, il faut résoudre l'équation $-2x^2 - x + 6 = 0$, qui a pour discriminant $\Delta = 1 + 48 = 49$ et admet comme racines $x_3 = \frac{1+7}{-4} = -2$ et $x_4 = \frac{1-7}{-4} = \frac{3}{2}$. Or, comme $3 < \sqrt{13} < 4$, on aura $x_1 < \frac{-1-3}{2} = -2$,

et $x_2 < \frac{-1+4}{2} = \frac{3}{2}$. Autrement dit, seule la racine $x_3 = -2$ se trouve dans notre intervalle de résolution, donc $\mathcal{S} = \{-2\}$. Par ailleurs, le trinôme $-2x^2 - x + 6$ est négatif à l'extérieur de ses racines, donc ici $f(x)$ sera négatif sur $[x_1, -2]$. On peut résumer le signe de $f(x)$ dans le tableau suivant :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)$		$-$	$+$

3. La fonction f est trivialement croissante sur chacun des deux intervalles $]-\infty, x_1]$ et $[x_2, +\infty[$ puisqu'on a alors $f(x) = x$. Elle est par ailleurs dérivable sur $]x_1, x_2[$, de dérivée $f'(x) = -4x - 1$, qui s'annule lorsque $x = -\frac{1}{4}$. On peut calculer $f\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{2}{16} + \frac{1}{4} + 6 = \frac{49}{8}$. Inutile par contre de calculer $f(x_1)$ qui est égal à $x_1 \simeq -2.3$ si on tient à bien le placer sur la courbe (on exploite la valeur approchée donnée dans l'énoncé). Idem pour $f(x_2) = x_2 \simeq 1.3$.

x	$+\infty$	x_1	$-\frac{1}{4}$	x_2	$+\infty$
f			$\frac{49}{8}$		

4. Voici une allure de courbe :