

# Programme de colle n° 23

MPSI Lycée Camille Jullian

semaine du 02/04 au 05/04 2024

La colle débutera par une question de cours portant sur l'énonciation d'un théorème, de définitions, ou la rédaction de l'une des démonstrations indiquées **en gras** dans le présent programme de colles. Tout élève ne sachant pas répondre correctement à cette question de cours se soumettra aux conséquences désagréables de sa paresse, lesdites conséquences étant laissées à la libre appréciation du colleur (mais les châtimements corporels étant hélas interdits, cela se limitera en général à une note en-dessous de la moyenne).

## Chapitre 17 : Espaces vectoriels.

- Définitions et exemples d'espaces et de sous-espaces vectoriels.
- Caractérisation des sous-espaces vectoriels (au choix : non vide et stable par somme et produit extérieur, ou non vide et stable par combinaisons linéaires).
- Familles de vecteurs :
  - Combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs, sous-espace vectoriel engendré par une famille, notation  $\text{Vect}$  et exemples d'utilisation (notamment pour les solutions de systèmes linéaires homogènes)
  - Familles génératrices, familles libres et liées, bases, coordonnées et composantes d'un vecteur dans une base
- Intersection de sous-espaces vectoriels, somme et somme directe de sous-espaces vectoriels, sous-espaces vectoriels supplémentaires, caractérisation à l'aide de bases ( $F$  et  $G$  sont supplémentaires si et seulement si l'union d'une base de  $F$  et d'une base de  $G$  donne une base de  $E$ ).
- Dimension :
  - définition d'un espace vectoriel de dimension finie (comme un espace qui admet une famille génératrice finie)
  - théorème de la base incomplète (on doit être capable d'appliquer l'algorithme permettant de compléter une famille libre en base d'un espace vectoriel en piochant des vecteurs dans une famille génératrice)
  - existence de bases dans un espace de dimension finie, lemme de Steinitz, définition de la dimension (toutes les bases ayant le même cardinal)
  - dans un espace de dimension  $n$ , toute famille libre (resp. génératrice) est constituée d'au plus (resp. au moins)  $n$  vecteurs, toute famille libre OU génératrice de  $n$  vecteurs est automatiquement une base
  - formule de Grassmann pour la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels :  $\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$
  - caractérisations de la supplémentarité à l'aide de la dimension ( $F$  et  $G$  sont supplémentaires s'ils vérifient deux conditions parmi  $F \cap G = \{0\}$ ,  $F + G = E$  et  $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$ )

- Espaces vectoriels usuels :
  - $\mathbb{R}^n$  est un espace vectoriel de dimension  $n$  admettant pour base canonique  $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1))$
  - $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$  est un espace vectoriel de dimension  $np$  admettant pour base canonique  $(E_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ , où  $E_{ij}$  est la matrice dont l'unique coefficient non nul est en position  $(i, j)$ , et est égal à 1
  - $\mathbb{R}_n[X]$  est un espace vectoriel de dimension  $n+1$  admettant pour base canonique  $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ , toute famille échelonnée de polynômes est libre
- aucune formule n'a été indiquée en gras pour ce chapitre mais on doit être capable de démontrer des résultats faciles comme « l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel » ou « l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille de vecteurs est un sous-espace vectoriel », et de donner une idée de la démonstration des résultats importants (formule de Grassmann, lemme de Steinitz).

## Chapitre 18 : Intégration.

- Construction de l'intégrale de Riemann :
  - continuité uniforme, **théorème de Heine**
  - espace vectoriel des fonctions en escalier sur un segment, subdivisions adaptées, intégrale des fonctions en escalier, propriétés fondamentales de cette intégrale (linéarité, relation de Chasles, positivité)
  - fonctions continues par morceaux sur un segment, approximation par les fonctions en escalier, définition de l'intégrale comme borne supérieure des intégrales de fonctions en escalier minorant  $f$ , égale à la borne inférieure des intégrales de fonctions en escalier majorant  $f$
  - extension des propriétés fondamentales à l'intégrale des fonctions continues par morceaux
- Inégalités et intégrales :
  - intégration d'inégalités sur un segment
  - si  $f$  est continue et positive sur  $[a, b]$ ,  $\int_a^b f(t) dt = 0$  ssi  $f = 0$
  - inégalité triangulaire  $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$
  - **inégalité de Cauchy-Schwartz**  $\left( \int_a^b fg \right)^2 \leq \int_a^b f^2 \times \int_a^b g^2$  (démontrée en étudiant le signe d'un trinôme)
- Exemples d'études de suites d'intégrales.
- **théorème fondamental de l'analyse** :  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est la primitive de  $f$  s'annulant en  $a$ , étude de fonctions définies par des intégrales à bornes variables (exemple vu en cours :  $f(x) = \int_x^{2x} \frac{\text{sh}(t)}{t} dt$ ).

Prévisions pour la semaine suivante : intégration.