Synthèse de l'oxalate ferrique

- Reprendre l'oxalate ferreux obtenu à la manipulation précédente (environ 6 g)
- Dissoudre dans 30 cm³ d'une solution chaude (60 – 70 °C) contenant 10 g de K₂C₂O₄ , H₂O
- Ajouter lentement , en agitant constamment et en maintenant la température inférieure à 40 °C 25 cm³ d' H₂O₂ à 20 volumes .
- Chauffer et amener à ébullition : un précipité de Fe(OH)₃ apparaît .
- Faire disparaître le précipité de Fe(OH)₃ en ajoutant 20 cm³ d' H₂C₂O₄ à 10 g / 100 cm³ ; terminer en ajoutant goutte à goutte et en agitant énergiquement la solution d' H₂C₂O₄ jusqu'à disparition complète du précipité . Pendant cette addition , la température est maintenue au voisinage de l'ébullition . (Il faut éviter un excès d' H₂C₂O₄ .)
- Ajouter 30 cm³ d'éthanol (prudence ! !) ; si des cristaux apparaissent , les redissoudre en chauffant doucement .
- Laisser reposer 1 h (au moins) à l'abri de la lumière .
- Filtrer sous vide et laver les cristaux avec 40 cm³ d'un mélange 1 / 1 d'éthanol – eau puis avec 30 cm³ d'acétone . Laisser l'aspiration se poursuivre pendant 5 min .
- Sécher et peser le produit obtenu et le conserver à l'abri de la lumière .

Dosage de l'oxalate ferrique

- Dissoudre exactement environ 0,2 g d'oxalate ferrique dans 50 cm³ d' H₂SO₄ 1/5 (en volume) . Ajouter 3 cm³ d' H₃PO₄ concentré .
- Amener la solution à ébullition .
- Doser par KMnO₄ 0,02 mol / L jusqu'à coloration rose persistante . (Au début du dosage , la décoloration peut prendre quelques secondes , puis elle devient rapide après les premiers mL de KMnO₄ versés .)
- Peser exactement environ 0,7 à 1 g d'oxalate ferrique . Décomposer le complexe par 30 cm³ d' H₂SO₄ concentré et chaud (PRUDENCE ! !)
- Laisser refroidir .
- Ajouter 2 à 3g de zinc et 5 cm³ d' H₂SO₄ concentré . (Prudence ! !) Laisser la réaction se poursuivre jusqu'à disparition du zinc . (La solution doit se décolorer) . Porter à ébullition . Vérifier que la réduction est complète par un test au thiocyanate . (Le test au thiocyanate est extrêmement sensible et l'on considèrera la réduction comme complète même si une goutte de la solution à doser colore **TRES** légèrement la solution de KSCN .)
- Doser par KMnO₄ 0,02 mol / L comme précédemment .

Compte rendu

(voir données à la fin)

- Demi-équations électroniques et bilan redox des réactions mises en œuvre aux cours des dosages .
- Résultats expérimentaux
- Calculs et stœchiométrie du complexe
- Calcul du rendement de la synthèse

Données

E° des couples redox mis en œuvre :

Les oxalates de fer

Synthèse de l'oxalate ferreux

- 60 cm³ d'eau chaude (60 – 70 °C) + 5 cm³ d' H₂SO₄ 1/5 (en volume) + 15 g de sel de Mohr .
- Ajouter 75 cm³ d'une solution d'acide oxalique à 10 g / 100 cm³ .
- Chauffer doucement jusqu'à la température d'ébullition : un précipité jaune d'oxalate ferreux apparaît .
- Laisser décanter et éliminer la solution surnageante .
- Ajouter 50 cm³ d'eau chaude (60 °C) , agiter , décanter puis filtrer sous vide .
- Laver le solide jaune avec 50 cm³ d'eau chaude , puis avec 50 cm³ d'acétone . Laisser l'aspiration se poursuivre pendant 5 min .
- Sécher et peser le produit obtenu .

Dosage de l'oxalate ferreux

- Dissoudre exactement environ 0,2 à 0,3 g d'oxalate ferreux dans 25 cm³ d' H₂SO₄ 1/5 (en volume) . Ajouter 3 cm³ d' H₃PO₄ concentré .
- Porter presque à ébullition .
- Doser par KMnO₄ 0,02 mol / L jusqu'à coloration rose persistante . (Au début du dosage , la décoloration peut prendre quelques secondes , puis elle devient rapide après les premiers mL de KMnO₄ versés .)
- Ajouter 2 à 3g de zinc et 5 cm³ d' H₂SO₄ concentré . (Prudence !!) Laisser la réaction se poursuivre jusqu'à disparition du zinc . (La solution doit se décolorer) . Porter à ébullition . Vérifier que la réduction est complète par un test au thiocyanate . (Le test au thiocyanate est extrêmement sensible et l'on considèrera la réduction comme complète même si une goutte de la solution à doser colore **TRES** légèrement la solution de KSCN .)
- Doser par KMnO₄ 0,02 mol / L comme précédemment .

Compte rendu

(voir données à la fin)

- Demi-équations électroniques et bilan redox des réactions mises en œuvre aux cours des dosages .
- Résultats expérimentaux
- Calculs et stœchiométrie du complexe
- Calcul du rendement de la synthèse