

**Feuille de TD 2**  
Intégrales impropres

**Exercice 1 :**

Étudier la nature des intégrales suivantes et déterminer leur valeur si elles convergent :

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}; \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t)t^2}; \quad \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{t}} dt; \quad \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^2}; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt; \quad \int_0^{+\infty} \tanh t dt; \quad \int_0^1 \ln x dx; \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx; \quad \int_0^{+\infty} \cos t dt$$

**Exercice 2 :**

Étudier la convergence des intégrales :

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}; \quad \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt; \quad \int_0^1 \frac{\log x}{1-x} dx; \quad \int_0^{+\infty} \frac{\log x}{\sqrt[3]{(x^2-x-2)^2}} dx.$$

**Exercice 3 :**

Étudier suivant les valeurs des réels  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  la convergence de l'intégrale :

$$I_{\alpha,\beta} = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha(1+t^\beta)}.$$

Représenter graphiquement l'ensemble  $C = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, I_{\alpha,\beta} \text{ converge}\}$ .

**Exercice 4 :**

Calculer à l'aide d'un changement de variable les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 \frac{t^3}{\sqrt{1-t^2}} dt; \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \log(\tan t) dt; \quad I_3 = \int_a^b \frac{dt}{\sqrt{(t-a)(b-t)}}, \text{ où } a < b$$

**Exercice 5 :**

Étudier la nature des intégrales :

$$\int_{-1}^{+1} \frac{dt}{t^2}; \quad \int_0^{+\infty} \arcsin\left(\frac{\sin t}{t}\right) dt; \quad \int_0^{+\infty} \cos(e^t) dt;$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\alpha} dt, \alpha > 0; \quad \int_0^{+\infty} (x+1 - \sqrt{x^2+2x+2}) dx; \quad \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sin t};$$

$$\int_0^1 \sin t \log t dt; \quad \int_1^{+\infty} \arctan \frac{1}{t} dt; \quad \int_{\frac{2}{3}}^{+\infty} \log\left(\cos \frac{1}{t}\right) dt;$$

$$\int_0^1 \frac{dt}{t^2 - \sqrt{t}}; \quad \int_0^{+\infty} (x^7 - 7x^4 + 16x^3 - 5x + 2)e^{-x} dx; \quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx;$$

**Exercice 6 :**

Déterminer pour quelles valeurs du paramètre réel  $a \in \mathbb{R}$  les intégrales suivantes sont convergentes.

$$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+a} dt; \quad I_2 = \int_0^1 \frac{1 - e^{-x} + a \sin x}{x^2} dx; \quad I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{5dx}{x^3 - ax^2 + x - a}$$

**Exercice 7 :**

Soit  $\alpha > 0$  et soit  $f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x}.$$

1. Montrer que  $f$  est de classe  $C^\infty$ , strictement positive puis que  $f$  n'est pas bornée.
2. Montrer que pour tout entier  $k \in \mathbb{N}^*$  nous avons :

$$\frac{\pi(-\pi/2 + k\pi)}{\sqrt{1 + (\pi/2 + k\pi)^\alpha}} \leq \int_{-\pi/2 + k\pi}^{\pi/2 + k\pi} \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x} dx \leq \frac{\pi(\pi/2 + k\pi)}{\sqrt{1 + (-\pi/2 + k\pi)^\alpha}}$$

En déduire que si  $k \in \mathbb{N}^*$  est assez grand nous avons :

$$\frac{\pi^{2-\alpha/2}}{2} \cdot \frac{1}{k^{\alpha/2-1}} \geq \int_{-\pi/2 + k\pi}^{\pi/2 + k\pi} \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x} dx \geq 3 \frac{\pi^{2-\alpha/2}}{2} \cdot \frac{1}{k^{\alpha/2-1}}$$

3. On considère la suite  $(u_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , définie par :

$$u_n = \sum_{k=1}^n \int_{-\pi/2 + k\pi}^{\pi/2 + k\pi} \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x} dx$$

Montrer que la suite  $(u_n)$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , est convergente si et seulement si nous avons  $\alpha > 4$ .

4. En déduire que l'intégrale impropre

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1 + x^\alpha \sin^2 x} dx$$

est convergente si et seulement si  $\alpha > 4$ .

**Exercice 8 :**

1. Montrer que la suite  $(u_n)$  suivante est divergente :

$$u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \log k}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

2. Montrer que pour tout entier  $k \geq 4$  nous avons :

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{\sin^2 t dt}{t \log t} \geq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{k \log k}.$$

3. En déduire que l'intégrale généralisée  $I$  suivante est divergente :

$$I = \int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 t dt}{t \log t}$$

**Exercice 9 :**

Donner un exemple (sous forme de dessin) de fonction continue positive telle que

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx$$

existe mais qu'on n'ait pas  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$