

# Devoir Surveillé n°4

PTSI B Lycée Eiffel

11 janvier 2014

## Exercice 1 : matrices (avec très peu de suites)

On note dans cet exercice  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -4 & 1 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

- Déterminer par la méthode de votre choix l'inverse  $P^{-1}$  de la matrice  $P$  (vous êtes priés de **vérifier** en testant le produit par  $P$  que votre inverse est correcte, ça peut resservir pour la suite de l'exercice).
- (a) Calculer  $A^2$  et  $A^3$ , puis exprimer  $A^3$  en fonction de  $A^2$  et de  $I_4$  (sans faire intervenir  $A$ ).  
(b) En déduire (sans refaire de pivot de Gauss!) l'inverse de la matrice  $A$ .
- (a) Calculer les produits  $AP$  et  $TP$  (s'il ne se passe rien de remarquable, recommencer).  
(b) Prouver que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $A^n = PT^nP^{-1}$ .  
(c) Calculer  $T^{-1}$  (ça doit être très rapide), et vérifier que la relation de la question précédente reste vraie pour  $n = -1$ .

- Montrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $T^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & u_n \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$ , et déterminer  $u_{n+1}$  en fonction de  $u_n$ . Cette relation permet-elle de calculer facilement  $u_n$  et  $T^n$  ?

- On pose  $B = T - 2I_4$ .
  - Calculer les premières puissances de  $B$  (au moins jusqu'à  $B^3$ ), en déduire l'expression de  $B^k$  pour les valeurs suivantes de  $k$ .
  - À l'aide de la formule du binôme de Newton, calculer  $T^n$ , et en déduire la valeur de  $u_n$ .
  - Détailler tous les coefficients de la matrice  $A^n$ .

## Exercice 2 : suites (sans l'ombre d'une matrice)

On considère deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  définies par  $u_0 = 3$  et les relations  $u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$  et  $v_n = \frac{7}{u_n}$ .

- Calculer les premiers termes de chaque suite (on s'arrêtera à  $u_2$  et  $v_2$ , en donnant évidemment des valeurs sous forme fractionnaire).
- Justifier que les deux suites ne comportent que des termes strictement positifs.
- Démontrer que  $(u_n + v_n)^2 - 28 = (u_n - v_n)^2$ , en déduire que  $u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{1}{4u_{n+1}}(u_n - v_n)^2$ , puis que  $u_n \geq v_n$  pour tout entier naturel  $n$ .
- Déterminer la monotonie de chacune des deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .
- (a) Montrer que,  $\forall n \geq 1$ ,  $u_n \geq \frac{21}{8}$ .  
(b) En déduire que  $u_{n+1} - v_{n+1} \leq \frac{1}{10}(u_n - v_n)^2$ .  
(c) Montrer par récurrence que  $u_n - v_n \leq \frac{1}{10^{2^n - 1}}$ , et en déduire la limite de la suite  $(u_n - v_n)$ .

6. Conclure des questions précédentes que les suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont adjacentes, et donner leur limite commune.
7. Déterminer une valeur approchée de  $\sqrt{7}$  à  $10^{-3}$  près.

### Exercice 3 : suites (avec pas mal de matrices)

On va s'intéresser dans ce dernier exercice à quelques propriétés d'une suite que vous connaissez bien : la suite de Fibonacci  $(F_n)$  définie par les conditions  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ .

#### I. Approximations rationnelles du nombre d'or.

Le nombre d'or est le réel  $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ , on pourra noter  $\psi = -\frac{1}{\varphi}$  l'opposé de son inverse si on le souhaite.

1. (a) Vérifier que  $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ .  
 (b) En remarquant que  $(F_n)$  est une suite d'un type bien connu, déterminer explicitement  $F_n$  en fonction de  $n$  (on ne sera pas surpris d'avoir des coefficients un peu laids, et on se posera par contre des questions philosophiques si  $\varphi$  n'intervient pas dans la formule).  
 Bon, comme la formule peut resservir à plusieurs endroits, je suis gentil, je vous en donne une version :  $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\varphi^n - \psi^n)$ .
2. On note, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$ .  
 (a) Donner la valeur des cinq premiers termes de la suite  $(u_n)$ .  
 (b) Étudier la monotonie de la suite  $(u_n)$  (ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de conclusion simple).  
 (c) En utilisant le résultat de la question 1, prouver que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \varphi$ .  
 (d) Déterminer une fonction simple  $f$  telle que  $u_{n+1} = f(u_n)$ . Étudier la fonction  $f$ , puis tracer dans un même repère une allure de sa courbe représentative et la droite d'équation  $y = x$ . Faire un schéma permettant de comprendre la monotonie et la limite de la suite  $(u_n)$  dans ce même repère.
3. (a) Montrer que,  $\forall n \geq 1$ ,  $|\varphi - u_n| = \frac{1}{\varphi^n F_n}$ , en déduire que  $|\varphi - u_n| \leq \frac{1}{F_n^2}$ .  
 (b) Donner un nombre rationnel approchant  $\varphi$  à  $10^{-4}$  près (on utilisera évidemment la question précédente). Est-ce une approximation par défaut ou par excès ? Donner les valeurs décimales approchées à  $10^{-4}$  près par défaut et par excès de  $\varphi$ .

#### II. Quelques propriétés rigolotes des nombres de Fibonacci.

1. En notant  $A$  la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ , montrer que, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,  $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$ .
2. Montrer en utilisant la question précédente que  $F_{n+p} = F_{n-1}F_p + F_nF_{p+1}$ . En déduire que tous les termes impairs de la suite de Fibonacci sont des nombres entiers pouvant s'écrire comme somme de deux carrés de nombre entiers.
3. Déterminer une relation entre  $A^2$ ,  $A$  et  $I_2$ . En déduire que,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $F_{2n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} F_k$ .
4. (a) Simplifier  $(I_2 - A)(I_2 + A + A^2 + \dots + A^n)$ .  
 (b) Calculer l'inverse de la matrice  $I_2 - A$ .  
 (c) À l'aide des deux résultats précédents, montrer que,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$ .
5. Une dernière question pour ceux qui s'ennuieraient (on ne sait jamais) : prouver que,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\arctan\left(\frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}\right) - \arctan\left(\frac{F_n}{F_{n+3}}\right) = \frac{\pi}{4}$ .