

Feuille d'exercices n°10 : Limites et continuité

PTSI B Lycée Eiffel

20 janvier 2014

Exercice 1 (* à ***)

Calculer les limites suivantes :

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 2}{x^2 - 4}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \sin(e^{-x})$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln(e^x + 1)}$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x - 1} - x\sqrt{x}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\ln(x)}}{(\ln(x))^x}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x + x^2 - 1)}{x}$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arccos(x) - \frac{\pi}{2}}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{Ent}(x)}{\sqrt{ x }}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 3x - 2}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{sh}(x)}{e^x}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sin^2(x)} - \frac{1}{1 - \cos(x)}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln(x) \ln(\ln(x))$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{x+1} - (x+1)^x$ | <ul style="list-style-type: none"> • $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{(\sqrt{x} - 1) \ln(x)}$ |

Exercice 2 (** à ***)

Étudier la continuité et les possibilités de prolongement par continuité des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$
2. $f(x) = \frac{1 - x}{1 - x^2}$
3. $f(x) = \frac{x^2 \ln(x)}{\sin(x)}$
4. $f(x) = \operatorname{Ent}(x) + \sqrt{x - \operatorname{Ent}(x)}$
5. $f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{3}{(x-1)^2}$
6. $f(x) = e^{\frac{1}{1-x}} + 2x - 3$
7. $f(x) = \frac{x \ln x}{x+1}$
8. $f(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{x^n}{n!}$

Exercice 3 (***)

On considère la fonction f définie par $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ si $x > 0$, et $f(x) = 0$ si $x \leq 0$. Montrer que f est continue sur \mathbb{R} . Calculer sa dérivée et montrer qu'elle est aussi continue. Faire de même avec la dérivée seconde. Pour les motivés : prouver que, quel que soit l'entier $n \in \mathbb{N}$, la dérivée n -ème de la fonction f est continue.

Exercice 4 (** à ***)

Déterminer toutes les fonctions vérifiant les conditions suivantes :

1. f est continue en 0 et en 1 et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x^2)$.
2. f est continue sur \mathbb{R} et $\forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{x+1}{2}\right) = f(x)$.
3. f est continue sur $\mathbb{R}, f(0) = 1$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x) \cos(x)$.
4. f est continue sur \mathbb{R} et $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$ (on commencera par prouver que, si $f(0) = f(1) = 0, f$ est périodique, et nulle).

Exercice 5 (*)

Montrer que les seules fonctions continues de \mathbb{R} dans \mathbb{Z} sont les fonctions constantes.

Exercice 6 (***)

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ vérifiant $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe un réel x tel que $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(x)$. Généraliser en prouvant qu'on peut toujours trouver un x tel que $f\left(x + \frac{1}{n}\right) = f(x)$, pour tout entier $n \geq 2$.

Exercice 7 (*)

Montrer que chacune des équations suivantes admet une solution sur l'intervalle I considéré.

1. $x^{2012} - x^{2011} = 1$ sur $I = [-1; 1]$.
2. $\ln x = \frac{x^2 - 5}{x + 2}$ sur $I = [1; 10]$.
3. $3x = 1 + \ln(2 + x^2)$ sur $I = [0; 1]$.
4. $e^x = 2 + x$ sur $[\ln 2; 2 \ln 2]$.
5. $x^3 - 3x^2 = -1$ sur $I = [-1; 1]$.

Déterminer par dichotomie (et en utilisant la calculatrice!) une valeur approchée à 0.01 d'une solution de chaque équation.

Exercice 8 (***)

On définit, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, la fonction f_n par $f_n(x) = x^n + 9x^2 - 4$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ a une seule solution strictement positive, qu'on notera désormais u_n .
2. Calculer u_1 et u_2 et vérifier que, $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in \left]0; \frac{2}{3}\right[$.
3. Montrer que, $\forall x \in]0; 1[, f_{n+1}(x) < f_n(x)$.
4. Que peut-on en déduire concernant la suite u_n ?
5. Montrer que u_n est convergente vers une limite qu'on notera l .
6. Déterminer la limite de u_n^n et en déduire la valeur de l .

Exercice 9 (**)

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = e^x + x$.

1. Montrer que f réalise une bijection de \mathbb{R} sur un intervalle à expliciter.
2. Justifier que pour tout entier positif n , l'équation $f(x) = n$ possède une unique solution que l'on notera par la suite x_n .
3. Déterminer la monotonie de la suite x_n .
4. Démontrer que $\forall n \geq 1, \ln(n - \ln n) \leq x_n \leq \ln n$.
5. En déduire la limite de la suite (x_n) puis celle de $\frac{x_n}{\ln(n)}$.

Exercice 10 (**)

On considère, pour tout entier naturel n , la fonction f_n définie par $f_n(x) = x^5 + nx - 1$.

1. Étudier les variations de f_n .
2. Montrer que, $\forall n \geq 1$, il existe un unique réel u_n tel que $f_n(u_n) = 0$.
3. Montrer que $u_n \leq \frac{1}{n}$ et en déduire la convergence de la suite (u_n) .
4. Montrer que (nu_n) admet une limite finie, que l'on précisera.

Exercice 11 (***)

Pour tout $n \geq 1$, on définit la fonction f_n sur \mathbb{R}^{+*} par $f_n(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 2$ admet une unique solution qu'on notera u_n .
2. Montrer que $\forall n \geq 2, u_n \in]0; 1[$.
3. Déterminer la monotonie de la suite (u_n) , et en déduire sa convergence.
4. Calculer la limite de la suite (on pourra commencer par prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n = 0$).
5. En posant $v_n = u_n - \frac{1}{2}$, montrer que $\left(\frac{1}{2} + v_n\right)^{n+1} = 2v_n$.