

Concours Blanc : épreuve de mathématiques

PTSI Lycée Eiffel

5 juin 2018

Durée : 4H. Calculatrices interdites.

Exercice 1

On note dans tout cet exercice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

On notera par ailleurs f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ ayant pour matrice A dans la base canonique (base qui sera notée $\mathcal{B}$ dans la suite de l'exercice).

On note enfin $F = \left\{ \begin{pmatrix} a+c & b & c \\ b & a+2c & b \\ c & b & a+c \end{pmatrix} \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$.

A. Calcul matriciel.

1. Calculer A^2 et montrer que $A^3 = 2A$.
2. Déterminer une base de $\ker(f)$ et de $\ker(f - \sqrt{2}id)$.
3. Soient $u = (1, 0, -1)$, $v = (1, \sqrt{2}, 1)$ et $w = (1, -\sqrt{2}, 1)$. Montrer que (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$, qu'on notera $\mathcal{B}'$.
4. Écrire la matrice de passage de la base canonique $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$. On notera P cette matrice.
5. Déterminer l'inverse P^{-1} de la matrice P .
6. Écrire la matrice A' de l'application f dans la base $\mathcal{B}'$.

B. Étude d'une application linéaire.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, et que la famille (I, A, A^2) en constitue une base.
2. Montrer que, $\forall M \in F, AM \in F$.
3. Soit $g : \begin{cases} F & \rightarrow & F \\ M & \mapsto & AM \end{cases}$.
 - (a) Montrer que $g \in \mathcal{L}(F)$.
 - (b) Écrire la matrice de g dans la base (I, A, A^2) .
 - (c) Montrer que $g \circ g \circ g = 2g$.
 - (d) Montrer que $\text{Im}(g^2 - 2\text{id}) \subset \ker(g)$.
 - (e) Déterminer une base de $\ker(g)$.
 - (f) Déterminer $\dim(\text{Im}(g))$.
 - (g) Résoudre dans F l'équation $g(M) = A + A^2$.

Exercice 2

On pose pour tout cet exercice $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$. On rappelle que $\ln(3) \simeq 1,1$ et $\ln(2) \simeq 0,7$.

I. Étude de la fonction f .

1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f .
2. Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(\sqrt{x})$.
3. Calculer un développement limité à l'ordre 2 en 0 de $f(x)$.
4. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0. On notera g ce prolongement.
5. Montrer que g est dérivable en 0. On précisera l'équation de la tangente à la courbe représentative de g en son point d'abscisse 0, ainsi que la position relative de cette tangente et de la courbe au voisinage de 0.
6. La fonction g est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ en 0?
7. Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variations complet. On pourra utiliser la fonction auxiliaire $k : x \mapsto x - (1+x)\ln(1+x)$.
8. Tracer une allure soignée de la courbe représentative de la fonction g .
9. Montrer que g réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ vers un intervalle à préciser.
10. Donner un développement limité à l'ordre 2 en 1 de la réciproque g^{-1} de la fonction g (on pourra exploiter l'égalité $g^{-1}(g(x)) = x$).

II. Étude d'une suite récurrente.

1. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution dans l'intervalle $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$. On notera cette solution α .
2. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - (a) Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
 - (b) En admettant que la dérivée f' est strictement croissante sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$, montrer que, $\forall x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, $|f'(x)| \leq 0.4$.
 - (c) Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_{n+1} - \alpha| \leq 0.4|u_n - \alpha|$.
 - (d) En déduire que $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} \times 0.4^n$, puis déterminer la limite de la suite (u_n) .
 - (e) Déterminer un entier n_0 tel que u_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-2} près (on donnera le résultat à l'aide d'une partie entière).

III. Dérivées successives de la fonction f .

On notera dans cette partie $f^{(n)}$ la dérivée n -ème de la fonction f (avec $n \in \mathbb{N}$).

1. Prouver que f est deux fois dérivable sur $]0, +\infty[$, et calculer $f''(x)$.
2. Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists T_n \in \mathbb{R}[X]$, $\exists a_n \in \mathbb{R}$, tels que

$$\forall x > 0, f^{(n)}(x) = \frac{T_n(x)}{x^n(1+x)^n} + a_n \frac{\ln(1+x)}{x^{n+1}}$$

3. Exprimer a_n en fonction de n .
4. On pose $u(x) = \ln(1+x)$ et $v(x) = \frac{1}{x}$.
 - (a) Déterminer les dérivées d'ordre k des fonctions u et v sur $]0, +\infty[$ (pour $k \in \mathbb{N}^*$).
 - (b) En déduire une expression de $f^{(n)}(x)$, puis celle du polynôme T_n (on ne cherchera pas à calculer explicitement chacun des coefficients du polynôme). Vérifier que l'expression obtenue pour $n = 2$ est correcte.