

Feuille d'exercices n° 10 : corrigé

PTSI B Lycée Eiffel

21 janvier 2021

Exercice 1 (* à ***)

- $\frac{2x^3 - 4x^2 + x - 2}{x^2 - 4} = \frac{2x^2(x-2) + x - 2}{(x-2)(x+2)} = \frac{2x^2 + 1}{x+2}$ si $x \neq 2$. On en déduit aisément que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - 4x^2 + x - 2}{x^2 - 4} = \frac{9}{4}$.
- En posant $X = e^{-x}$, on aura $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = 0$, et $e^x \sin(e^{-x}) = \frac{\sin(X)}{X}$ a donc pour limite 1 (limite classique vue en cours). On en déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \sin(e^{-x}) = 1$.
- En factorisant par e^x dans le ln, $\frac{x^2}{\ln(e^x + 1)} = \frac{x^2}{x + \ln(1 + e^{-x})} = \frac{x}{1 + \frac{\ln(1+e^{-x})}{x}}$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln(1 + e^x)} = +\infty$.
- Quantité conjuguée complètement superflue ici : $\sqrt{x^2 + x - 1} - x\sqrt{x} = x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} - \sqrt{x} \right)$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x - 1} - x\sqrt{x} = -\infty$.
- $\frac{x^{\ln(x)}}{(\ln(x))^x} = e^{\ln^2(x) - x \ln(\ln(x))}$. Or, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^2(x) - x \ln(\ln(x)) = -\infty$ par croissance comparée. Du coup, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\ln(x)}}{(\ln(x))^x} = 0$.
- L'encadrement $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos(x + x^2 - 1)}{x} \leq \frac{1}{x}$ suffit à conclure par le théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x + x^2 - 1)}{x} = 0$.
- On reconnaît ici l'inverse du taux d'accroissement de la fonction arccos en 0 : $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\arccos(x) - \arccos(0)}{x - 0} = \arccos'(0) = -\frac{1}{\sqrt{1-0}} = -1$. Comme $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$, on en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arccos(x) - \frac{\pi}{2}} = \frac{1}{-1} = -1$.
- Encore une histoire d'encadrement : $\frac{1}{x} - 1 < \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$, donc $1 - x \leq x \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$ si $x \geq 0$ (sinon, l'encadrement est le même mais avec les inégalités dans l'autre sens). Dans les deux cas, les deux membres extrêmes de l'encadrement ont pour limite 1 en 0, donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 1$.
- On écrit $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$ et on conclut immédiatement à l'aide de la croissance comparée que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$.
- Si $x \in [0; 1[$, $x - \text{Ent}(x) = x$, donc $\frac{x - \text{Ent}(x)}{\sqrt{|x|}} = \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \text{Ent}(x)}{\sqrt{|x|}} = 0$. De

l'autre côté, sur $[-1; 1[$, $x - \text{Ent}(x) = x - 1$, donc $\frac{x - \text{Ent}(x)}{\sqrt{|x|}} = \frac{x - 1}{\sqrt{-x}}$, qui tend vers $-\infty$ en 0^- . Il n'y a donc pas de limite en 0.

- Encore un coup où -1 est racine du numérateur et du dénominateur. Le numérateur a pour autre racine évidente 1, et le produit des racines vaut 1, donc -1 est en fait racine double et le numérateur se factorise en $(x - 1)(x + 1)^2$. Le dénominateur se factorise sous la forme $(x + 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (a + b)x^2 + (b + c)x + c$; par identification très facile, $a = 1$, $b = -1$ et $c = -2$, donc $\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 3x - 2} = \frac{(x - 1)(x + 1)^2}{(x + 1)(x^2 - x - 2)} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x + 1)(x - 2)} = \frac{x - 1}{x - 2}$ si $x \neq -1$. Suffisant pour conclure que $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 3x - 2} = \frac{2}{3}$.
- Encore du boulot pour le passage à l'exponentielle : $\left(\frac{\ln(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{(\ln(\ln(x)) - \ln(x))/x}$. Tout ce qui est dans l'exponentielle tend vers 0 par croissance comparée, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- Il suffit d'écrire $\frac{\text{sh}(x)}{e^x} = \frac{e^x + e^{-x}}{2e^x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2e^{2x}}$ pour constater que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sh}(x)}{e^x} = \frac{1}{2}$.
- On peut écrire $\frac{2}{\sin^2(x)} - \frac{1}{1 - \cos(x)} = \frac{2}{1 - \cos^2(x)} - \frac{1}{1 - \cos(x)} = \frac{2}{(1 - \cos(x))(1 + \cos(x))} = \frac{1}{1 + \cos(x)}$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sin^2(x)} - \frac{1}{1 - \cos(x)} = \frac{1}{2}$.
- Il suffit ici de poser $X = \ln(x)$. Quand x tend vers 1, X tend vers 0, et $\ln(x) \ln(\ln(x)) = X \ln(X)$. Comme on sait, par croissance comparée, que $\lim_{X \rightarrow 0} X \ln(X) = 0$, alors $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x) \ln(\ln(x)) = 0$.
- Quantité conjuguée : $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} = \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}}$


$$= \frac{\sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}}{\sqrt{x} \left(1 + \sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{x\sqrt{x}}}}\right)}, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} = \frac{1}{2}.$$
- $x^{x+1} - (x+1)^x = x^x \left(x - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right)$. Or, $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$. En posant $X = \frac{1}{x}$, $x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1 + X)}{X}$, qui a pour limite 1 car X tend vers 0 (limite classique), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e^1 = e$. Finalement, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{x+1} - (x+1)^x = +\infty$.
- $\frac{x^2 - 1}{(\sqrt{x} - 1) \ln(x)} = \frac{(x+1)(x-1)}{(\sqrt{x} - 1) \ln(x)} = \frac{(x+1)(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 1)}{(\sqrt{x} - 1) \ln(x)} = \frac{(x+1)(\sqrt{x} + 1)}{\ln(x)}$. Plus de forme indéterminée, on a directement $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{(\sqrt{x} - 1) \ln(x)} = +\infty$.

Exercice 2 (** à ***)


1. La fonction f est évidemment définie et continue sur $\mathbb{R}^*$. En 0, une limite classique du cours permet d'affirmer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, donc f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}$ en posant $f(0) = 1$.
2. La fonction f est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$. Quand x tend vers -1 , le numérateur de f tend vers 2 et le dénominateur vers 0, on ne peut pas avoir de limite finie, et donc pas

de prolongement par continuité. Par contre, $f(x) = \frac{1-x}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{1+x}$ si $x \neq 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$, et f est prolongeable par continuité en posant $f(1) = \frac{1}{2}$.


3. La fonction f est définie et continue sur tous les intervalles de la forme $]k\pi; (k+1)\pi[$, pour $k \in \mathbb{N}$. Si $k \neq 0$, $(k\pi)^2 \ln(k\pi)$ est une constante non nulle, donc la fonction f ne peut pas avoir de limite finie en $k\pi$ (en l'occurrence, elle tend vers $+\infty$ à gauche et $-\infty$ à droite si k est impair, et le contraire si k est pair, à cause du signe de $\sin(x)$ au voisinage de $k\pi$). Par contre, $\frac{x^2 \ln(x)}{\sin(x)} = \frac{x}{\sin(x)} \times x \ln(x)$, donc par croissance comparée et en utilisant une limite classique, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, ce qui permet de prolonger par continuité en posant $f(0) = 0$.
4. La fonction f est définie et continue sur tous les intervalles de la forme $]n; n+1[$, pour $n \in \mathbb{Z}$. On peut même ajouter, puisque la fonction partie entière est continue à droite en chaque entier, que $\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = f(n) = n + \sqrt{n-n} = n$. Par ailleurs, $\lim_{x \rightarrow n^-} \text{Ent}(x) = n-1$, donc $\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = n-1 + \sqrt{n-(n-1)} = n-1+1 = n$. Finalement, la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ (pas besoin de prolonger quoi que ce soit ici, la fonction f est déjà définie sur $\mathbb{R}$). Une allure de la courbe :



5. La fonction f est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. En 1, on peut écrire $f(x) = \frac{x-1-3}{(x-1)^2} = \frac{x-4}{(x-1)^2}$. Le dénominateur étant non nul quand $x = 1$, pas de limite finie en vue, et donc pas de prolongement par continuité.
6. Cette drôle de fonction est définie et continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Comme $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1-x} = +\infty$, on aura $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$, donc pas de prolongement possible. Pourtant, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1-x} = -\infty$, et par conséquent $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$. On est en présence d'un cas assez rare : la fonction est prolongeable « par continuité à droite » en posant $f(1) = -1$. Une allure de la courbe :



7. La fonction f est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$, et prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$ (croissance comparée). L'énoncé serait plus intéressant avec $g(x) = \frac{x \ln(x)}{x-1}$, qui est définie et continue sur $]0; 1[\cup]1; +\infty[$, et prolongeable en 0 (même raisonnement que pour f) mais aussi en 1 en posant $g(1) = 1$, à cause de la limite classique $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$.
8. En fait, cette fonction extrêmement étrange n'est pas si affreuse que ça à étudier, puisqu'on peut l'expliciter intervalle par intervalle. Regardons d'abord ce qui se passe sur $\mathbb{R}_+$, et notons $f_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} - \frac{x^n}{n!}$. On constate que $f'_n(x) = \frac{x^n}{n!} - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = f_{n-1}(x)$. Par ailleurs, $f_n(x) = 0 \Leftrightarrow n!x^{n+1} = (n+1)!x^n$, ce qui se produit lorsque $x = 0$ ou $x = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1$. La fonction f_n est donc décroissante sur $[0; n]$ et croissante sur $[n; +\infty]$, et surtout négative sur $[0; n+1]$ puisque'elle y est décroissante puis croissante et s'annule en 0 et en $n+1$, et positive sur $[n+1; +\infty[$. On déduit de ces constatations que, sur l'intervalle $[0; 1]$, $\frac{x^0}{0!} \geq \frac{x^1}{1!} \geq \frac{x^2}{2!}$ etc, donc $f(x) = \frac{x^0}{0!} = 1$. Sur $[1; 2]$, $\frac{x^0}{0!} \leq \frac{x^1}{1!}$, mais $\frac{x^1}{1!} \geq \frac{x^2}{2!}$ etc, donc $f(x) = \frac{x^1}{1!} = x$. De même, sur chaque intervalle de la forme $[n; n+1]$, $f(x) = \frac{x^n}{n!}$. Toutes ces fonctions étant continues, et les changements de fonction s'effectuant à des points d'intersection de deux courbes de fonctions continues, la fonction f sera continue sur $\mathbb{R}^+$. Sur $\mathbb{R}^-$, c'est extrêmement similaire, la seule différence étant due au fait que les entiers impairs sont à oublier puisque $\frac{x^n}{n!}$ prend des valeurs négatives sur $\mathbb{R}^-$ lorsque n est impair (la valeur de f est donc constante côté négatif jusqu'à $x = -\sqrt{2}$, valeur en-deça de laquelle on aura $\frac{x^2}{2} > 1$, on conserve ensuite $f(x) = \frac{x^2}{2}$ jusqu'à avoir $\frac{x^4}{24} = \frac{x^2}{2}$, soit lorsque $x = -\sqrt{12}$, et ainsi de suite). Voici un bout de la courbe de la fonction f (les morceaux correspondant à des valeurs de n différentes sont de différentes couleurs) :



Exercice 3 (***)

Seul 0 peut poser un problème de continuité à droite. Or, $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{x^2} = -\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, et f est bien continue en 0. De plus, $\forall x > 0$, $f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$. Posons $X = \frac{1}{x}$, on a alors $f'(x) = 2X^3 e^{-X^2}$, qui par croissance comparée a pour limite 0 en $+\infty$, donc f' est également continue en 0. On fait le même type de calcul pour f'' : $\forall x > 0$, $f''(x) = \left(\frac{6}{x^4} + \frac{4}{x^6} \right) e^{-\frac{1}{x^2}}$, qui a également pour limite 0 en 0.

Pour les dérivées ultérieures, le principe est le même, mais pour tout traiter d'un seul coup, il est nécessaire d'effectuer une récurrence pour prouver que la n -ième dérivée de la fonction f (sur $]0; +\infty[$) peut s'écrire sous la forme $\frac{P_n(x)}{x^{a_n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$, où a_n est un entier naturel et P_n est un polynôme. C'est vrai pour $n = 1$ et même $n = 2$ d'après les calculs précédents. Supposons désormais que $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{a_n}} e^{-\frac{1}{x^2}}$. On peut dériver cette fonction sur $]0; +\infty[$ et obtenir $\frac{x^{a_n} P'_n(x) - a_n n x^{a_n-1} P_n(x)}{x^{2a_n}} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{2P_n(x)}{x^{a_n+3}} e^{-\frac{1}{x^2}}$. Ceci est bien de la forme voulue, ce qui achève la récurrence. Or, un quotient de polynômes multiplié par $e^{-\frac{1}{x^2}}$ a toujours pour limite 0 en 0 (toujours de la croissance comparée), donc la dérivée n -ième de f est continue en 0.

Exercice 4 (** à ***)

1. Par une récurrence facile, si $f(x) = f(x^2)$, on aura, pour tout entier naturel n , $f(x) = f(x^{2^n})$. En effet, c'est vrai pour $n = 1$ (et même $n = 0$), et si on le suppose vrai pour un entier n , alors $f(x) = f(x^{2^n}) = f((x^{2^n})^2) = f(x^{2^{n+1}})$. Si $x \in [0; 1[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{2^n} = 0$ (mettez sous forme exponentielle si ça ne vous semble pas clair), donc par continuité de f en 0, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{2^n}) = f(0)$. Comme la suite $(f(x^{2^n}))$ est constante égale à $f(x)$, on en déduit que $\forall x \in [0; 1[$, $f(x) = f(0)$. La fonction f est donc constante sur $[0; 1[$. En particulier, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(0)$, donc, par continuité de f en 1, $f(1) = f(0)$. Occupons-nous maintenant des réels strictement supérieurs à 1. On ne peut pas appliquer le même raisonnement que ci-dessus, mais par contre on constate que $f(x^{\frac{1}{2^n}}) = f(x)$ pour tout entier n , en appliquant simplement la remarque initiale à $x^{\frac{1}{2^n}}$. Cette fois-ci, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2^n}} = 1$ (puisque $x^{\frac{1}{2^n}} = e^{\frac{\ln(x)}{2^n}}$, qui tend vers $e^0 = 1$), et on conclut comme tout à l'heure que $f(x) = f(1) = f(0)$. La fonction f est donc constante sur $\mathbb{R}_+$. Et sur $\mathbb{R}^-$? Si $x \leq 0$, $x^2 \geq 0$, donc $f(x) = f(x^2) = f(0)$. Finalement, la fonction f est

constante. Réciproquement, toute fonction constante est évidemment solution du problème posé.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$ et (u_n) la suite récurrente définie par $u_0 = x$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$. Par une récurrence immédiate, on aura toujours $f(u_n) = f(x)$ (en effet, c'est vrai pour u_0 et $f(u_{n+1}) = f\left(\frac{u_n + 1}{2}\right) = f(u_n)$). Étudions donc le comportement de la suite (u_n) . Pour cela, on pose $g(x) = \frac{x+1}{2}$, qui est une fonction affine strictement croissante admettant un unique point fixe $x = 1$. De plus, $g(x) - x \leq 0$ si $x \geq 1$, et $g(x) - x \geq 0$ si $x \leq 1$. Si $x \geq 1$, on prouve par une récurrence immédiate que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 1$, et la suite étant décroissante, elle va nécessairement converger vers l'unique point fixe de la fonction, à savoir 1. De même, si $x \leq 1$, la suite est croissante majorée par 1, et converge vers 1. Dans tous les cas, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$, donc par continuité de la fonction f , $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(1)$. La suite $(f(u_n))$ étant constante égale à $f(x)$, on en déduit que $f(x) = f(1)$. La fonction f est donc constante. Réciproquement, les fonctions constantes sont solutions triviales du problème posé.

3. Comme dans les autres problèmes de cet exercice, il faut essayer d'itérer l'équation donnée, en divisant par 2 plutôt qu'en multipliant (car c'est plus pratique pour trouver des limites) : $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{4}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{8}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{4}\right) \cos\left(\frac{x}{8}\right)$ etc. Une récurrence simple permet de prouver que $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right)$:

c'est vrai au rang 0 puisque la condition est alors $f(x) = f(x)$, et si on le suppose au rang n , il suffit de remplacer le $f\left(\frac{x}{2^n}\right)$ par $f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$ pour obtenir la relation au rang $n+1$. reste l'astuce diabolique du jour : tout multiplier par $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right)$. En effet,

$\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{x}{2^k}\right) = \frac{\sin(x)}{2^n}$. Si ça ne vous semble pas clair c'est que vous avez du oublier la formule de duplication $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$. Allez, prouvons-le quand même par récurrence : au rang 0, $\sin(x) = \sin(x)$ est vrai. Supposons la formule vraie au rang n , alors $\sin\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) \cos\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(2 \times \frac{1}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)$. Ne reste plus qu'à appliquer l'hypothèse de récurrence pour trouver $\frac{1}{2} \times \frac{\sin(x)}{2^n} = \frac{\sin(x)}{2^{n+1}}$. Bref, après ces calculs fantastiquement élémentaires, il nous reste la relation $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) f(x) = \frac{\sin(x)}{2^n} f\left(\frac{x}{2^n}\right)$.

Considérons un $x \neq 0$, alors à partir d'un certain rang $\sin\left(\frac{x}{2^n}\right) \neq 0$, et on peut écrire $f(x) = \frac{\sin(x)}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)} f\left(\frac{x}{2^n}\right)$. Il ne reste plus qu'à faire gentiment tendre n vers $+\infty$, alors

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^n} = 0$, donc par continuité $\lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0) = 1$; et $\frac{1}{2^n \sin\left(\frac{x}{2^n}\right)}$ a pour limite $\frac{1}{x}$ (limite classique de $\frac{\sin(x)}{x}$ en 0). Finalement, la limite du tout quand n tend vers $+\infty$ vaut $\frac{\sin(x)}{x}$.

Puisque la suite est constante, on en déduit que $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ (prolongée par continuité en 0 en posant $f(0) = 1$). On vérifie aisément que cette fonction est solution : $f(x) \cos(x) = \frac{\sin(x) \cos(x)}{x} = \frac{\sin(2x)}{2x} = f(2x)$.

4. Supposons donc $f(0) = f(1) = 0$. La fonction f est alors impaire puisque $f(x) + f(-x) = 2f\left(\frac{x-x}{2}\right) = 2f(0) = 0$. Par ailleurs, en prenant $y = 2-x$ (pourquoi pas ?), on constate que $f(x) + f(2-x) = 2f\left(\frac{x+2-x}{2}\right) = 2f(1) = 0$, donc $f(x) = -f(2-x) = f(x-2)$. Ceci prouve

que la fonction f est 2-périodique. Or, une fonction périodique et continue est nécessairement bornée. En effet, ici, f est sûrement bornée sur $[0; 2]$ puisque l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, et f reprend ensuite les mêmes valeurs que sur $[0; 2]$, donc les bornes restent valables sur $\mathbb{R}$. or, si la fonction n'était pas nulle, il existerait certainement un x tel que $f(x) > 0$ (puisque f est impaire). La relation initiale implique, en prenant $x = y$, que $f(x) = \frac{1}{2}f(2x)$, ou si on préfère que $f(2x) = 2f(x)$. Par une récurrence facile, on prouve alors que, pour tout entier n , $f(2^n x) = 2^n f(x)$. En effet, c'est vrai au rang 0, et en le supposant au rang n , $f(2^{n+1}x) = f(2 \times 2^n x) = 2f(2^n x) = 2 \times 2^n f(x) = 2^{n+1}f(x)$. En appliquant ceci à notre x dont l'image est strictement positive, on obtiendra $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(2^n x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n f(x) = +\infty$, ce qui est très contradictoire avec le fait que la fonction f est bornée. La fonction f est donc nécessairement nulle.

Passons au cas général, et posons $b = f(0)$ et $a = f(1) - f(0)$. La fonction $g : x \mapsto f(x) - ax - b$ vérifie les hypothèses du cas particulier précédent : $g(0) = f(0) - b = 0$; $g(1) = f(1) - (f(1) - f(0)) - f(0) = 0$, et $g\left(\frac{x+y}{2}\right) = f\left(\frac{x+y}{2}\right) - a\left(\frac{x+y}{2}\right) - b = \frac{1}{2}(f(x) + f(y)) - \frac{1}{2}(ax + ay) - \frac{1}{2}(b + b) = \frac{1}{2}(g(x) + g(y))$. La fonction g est donc nulle. Autrement dit, $f(x) = ax + b$, c'est-à-dire que f est une fonction affine. Réciproquement, toutes les fonctions affines sont solutions du problème posé (on l'a déjà vérifié sans le dire en faisant le petit calcul pour g).

Exercice 5 (*)

Supposons par l'absurde que f soit une fonction continue sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{Z}$, et que f ne soit pas constante. Autrement dit, on peut trouver deux réels x et y tels que $f(x) = n$ et $f(y) = p$, avec $n \neq p$. Mais alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, tout réel compris entre n et p admet des antécédents par la fonction f . Comme il existe certainement autre chose que des nombres entiers entre n et p , ce n'est pas possible.

Exercice 6 (***)

Dans le cas $n = 2$, on pose $g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x)$. La fonction g est définie sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$, continue puisque f est supposée continue, et $g(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0)$ et $g(1) = f(1) - f\left(\frac{1}{2}\right) = -g(0)$ puisque $f(1) = f(0)$. L'intervalle $[g(0); g(1)]$ (dans ce sens ou dans l'autre, on ne sait pas lequel des deux est le plus grand) contient donc certainement 0, et le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer l'existence d'un x tel que $g(x) = 0$, c'est-à-dire $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f(x)$.

Le cas général se traite plus ou moins de la même façon : on pose $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$, g est continue sur $\left[0; \frac{n-1}{n}\right]$. Par ailleurs, $g(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)$; $g\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)$; ... ; $g\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)$. On constate que $\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$ après un beau télescopage. si la somme de ces n réels est nulle, il en existe nécessairement un positif (au sens large) et un négatif (au moins). On conclut comme précédemment : l'intervalle entre ces deux valeurs contient 0, donc 0 admet un antécédent par g , ce qui suffit à conclure.

Exercice 7 (*)

Le principe est le même à chaque fois : la fonction étudiée est continue, et les signes des valeurs prises aux extrémités de l'intervalle sont opposés. Par le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction s'annule sur l'intervalle.

1. Posons $f(x) = x^{2021} - x^{2020} + 1$, $f(-1) = -1 - 1 + 1 = -1$, et $f(1) = 1 - 1 + 1 = 1$, donc f s'annule sur I . Par dichotomie, on obtient successivement, en notant a la solution cherchée, $f(0) = 1$ donc $a \in [-1, 0]$, puis $f(-0.5) \simeq 1$ donc $a \in [-1, -0.5]$ etc. Il n'est pas très difficile de se convaincre que la valeur de a est extrêmement proche de -1 : $x^{2021} - x^{2020} = x^{2020}(x - 1)$, avec $x - 1 \in [-2, -1]$, donc x^{2020} doit être compris entre -0.5 et 1 pour que l'équation puisse être vérifiée, ce qui implique $0.5 \leq (-x)^{2020} \leq 1$, soit $\ln 0.5 \leq 2020 \ln(-x) \leq 0$, donc $e^{\frac{0.5}{2020}} \leq -x \leq 1$, soit $-x = 1$ à 0.001 près. On a donc $x \simeq -1$ à 0.001 près.
2. Posons $f(x) = \ln x - \frac{x^2 - 5}{x + 2}$, $f(1) = 0 - \frac{-4}{3} = \frac{4}{3}$, et $f(10) = \ln 10 - \frac{95}{12} < 0$ (car par exemple $e^4 > 2^4 > 16$, donc $4 > \ln 10$, et $\frac{95}{12} > 4 > \ln 10$), donc f s'annule sur I . Plutôt que de couper exactement en 2, faisons une dichotomie avec des valeurs pas trop affreuses : $f(5) \simeq -1.24$, donc $a \in [1; 5]$, puis $f(3) \simeq 0.30$, donc $a \in [3; 5]$; $f(4) \simeq -0.44$ donc $a \in [3; 4]$; $f(3.5) \simeq -0.6$ donc $a \in [3; 3.5]$; $f(3.25) \simeq 0.12$ donc $a \in [3.25; 3.5]$; $f(3.375) \simeq 0.03$ donc $a \in [3.375; 3.5]$; $f(3.44) \simeq -0.02$ donc $a \in [3.375; 3.44]$; $f(3.41) \simeq 0.001$, donc $a \in [3.41; 3.44]$; et enfin $f(3.425) \simeq -0.001$ donc $a \in [3.41; 3.425]$. On a donc $a \simeq 3.42$ à 0.01 près.
3. Posons $f(x) = 3x - 1 - \ln(2 + x^2)$, $f(0) = 0 - 1 - \ln 2 < 0$ et $f(1) = 3 - 1 - \ln 3 = 2 - \ln 3 > 0$, car $e^2 > 3$, donc $\ln 3 < 2$. La fonction s'annule donc sur I . Toujours le même principe, je vais aller un peu plus vite : on calcule $f(0.5) \simeq -0.31$, puis $f(0.75) \simeq 0.31$; $f(0.625) \simeq 0.003$; $f(0.56) \simeq -0.16$; $f(0.59) \simeq -0.08$ et $f(0.61) \simeq -0.03$, dont on déduit que $a \simeq 0.62$ à 0.01 près. Constatons que quand on tombe au milieu des calculs sur une valeur très proche de 0, on a de bonnes chances d'être très près de la solution cherchée...
4. Posons $f(x) = e^x - 2 - x$, $f(\ln 2) = 2 - 2 - \ln 2 < 0$, et $f(2 \ln 2) = 4 - 2 - 2 \ln 2 = 2(1 - \ln 2) > 0$, donc f s'annule sur I . Ici, les bornes de l'intervalle sont moyennement pratiques, mais elles valent environ 0.7 et 1.4, ce qui permet de couper en 1 puis de prendre des valeurs plus rondes ensuite : $f(1) \simeq -0.28$; $f(1.2) \simeq 0.12$; $f(1.1) \simeq -0.10$; $f(1.15) \simeq 0.008$; $f(1.125) \simeq -0.04$; $f(1.14) \simeq -0.01$, donc $a \simeq 1.14$ à 0.01 près.
5. Posons $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, $f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Ça ne marche pas ? Si, car $f(0) = 1$, donc f s'annule en fait au moins deux fois sur I : une fois sur $[-1; 0]$ et une autre sur $[0; 1]$. Pour la dichotomie, contentons-nous de déterminer une valeur approchée de la solutions se trouvant dans $[0; 1]$ (on peut naturellement trouver également une approximation de la deuxième racine dont on connaît l'existence) : $f(0.5) = .375$; $f(0.75) \simeq -0.27$; $f(0.625) \simeq 0.07$; $f(0.69) \simeq -0.10$; $f(0.66) \simeq -0.02$; $f(0.64) \simeq 0.03$, donc $a \simeq 0.65$ à 0.01 près (pour les curieux, la racine appartenant à $[-1; 0]$ vaut environ -0.53).

Exercice 8 (***)

1. La fonction f_n étant somme de deux fonctions strictement croissantes (et d'une constante) sur $[0; +\infty[$, elle l'est également. Comme de plus elle est continue, $f(0) = -4$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$, le théorème de la bijection nous permet d'affirmer l'existence d'un unique réel positif u_n tel que $f_n(u_n) = 0$.
2. u_0 est solution positive de l'équation $1 + 9x^2 - 4 = 0$, soit $x^2 = \frac{1}{3}$, donc $u_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Pour $n = 1$, l'équation devient $9x^2 + x - 4 = 0$, qui a pour discriminant $\Delta = 1 + 144 = 145$, et admet deux racines dont une strictement positive (d'après la question précédente) qui ne

- peut être que $u_1 = \frac{-1 + \sqrt{145}}{18} \simeq 0.61$. De même, u_2 est solution positive de l'équation $10x^2 = 4$, d'où $u_2 = \sqrt{\frac{2}{5}} \simeq 0.63$. Pour vérifier que $u_n < \frac{2}{3}$, il suffit de constater que $f_n\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^n + 9 \times \frac{4}{9} - 4 = \frac{2^n}{3^n} > 0$, et d'appliquer la croissance stricte de la fonction f_n à l'inégalité $0 = f_n(u_n) < f_n\left(\frac{2}{3}\right)$.
3. On a $f_{n+1}(x) - f_n(x) = x^{n+1} + 9x^2 - 4 - x^n - 9x^2 + 4 = x^n(x - 1)$. Cette expression étant négative si $x < 1$, on en déduit que $\forall x \in]0; 1[, f_{n+1}(x) < f_n(x)$.
 4. On a notamment, puisque $0 < u_n < \frac{2}{3}$, $f_{n+1}(u_n) < f_n(u_n) = 0$. Comme par ailleurs $f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$, on a donc $f_{n+1}(u_n) < f_{n+1}(u_{n+1})$, ce dont on déduit via stricte croissance de f_{n+1} que $u_n < u_{n+1}$. Autrement dit, la suite (u_n) est strictement croissante.
 5. La suite étant croissante et majorée par $\frac{2}{3}$, elle converge.
 6. Comme $0 < u_n < \frac{2}{3}$, $0 < u_n^n < \left(\frac{2}{3}\right)^n$, donc via le théorème des gendarmes (et le fait que le membre de droite est une suite géométrique de raison inférieure à 1, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^n = 0$). Or, on a par définition $u_n^n + 9u_n^2 - 4 = 0$ (puisque $f_n(u_n) = 0$). On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 9u_n^2 - 4 = 0$, soit $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^2 = \frac{4}{9}$. Comme $u_n > 0$, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{3}$.

Exercice 9 (**)

1. La fonction est somme de deux fonctions strictement croissantes, donc est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, donc par théorème de la bijection, f est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
2. C'est une conséquence immédiate de la bijectivité de f .
3. Par définition, $f(x_n) < f(x_{n+1})$, donc par stricte croissance de f , $x_n < x_{n+1}$, et la suite (x_n) est strictement croissante.
4. C'est un calcul d'images : $f(\ln n) = e^{\ln n} + \ln n = n + \ln n \geq n$ si $n \geq 1$, donc on a $f(x_n) \leq f(\ln n)$, d'où $x_n \leq \ln n$. De même, $f(\ln(n - \ln n)) = e^{\ln(n - \ln n)} + \ln(n - \ln n) = n - \ln n + \ln(n - \ln n) = n - \ln \frac{n}{n - \ln n} < n$ puisque $\frac{n}{n - \ln n} < 1$. On en déduit de même que $\ln(n - \ln n) \leq x_n$.
5. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} n - \ln n = +\infty$ (croissance comparée), on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n - \ln n) = +\infty$, d'où par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. De plus, $\frac{\ln(n - \ln n)}{\ln n} \leq \frac{x_n}{\ln n} \leq 1$, avec $\frac{\ln(n - \ln n)}{\ln n} = \frac{\ln n + \ln(1 - \frac{\ln n}{n})}{\ln n} = 1 + \frac{\ln(1 - \frac{\ln n}{n})}{\ln n}$. La quotient a pour limite 0, donc la suite $(\frac{x_n}{\ln n})$ est encadrée par deux suites de limite 1. Via le théorème des gendarmes, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{\ln(n)} = 1$.

Exercice 10 (**)

1. Calculons donc la dérivée $f'_n(x) = 5x^4 + n$. Cette dérivée est toujours strictement positive (sauf en 0 pour $n = 0$), la fonction est donc strictement croissante, quel que soit l'entier n .
2. Comme de plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, chaque fonction f_n est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Chaque réel a donc un unique antécédent par f_n et en particulier l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution.

3. Constatons que $f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^5} + 1 - 1 = \frac{1}{n^5} > 0$. Comme la fonction f_n est strictement croissante, et $f_n(u_n) = 0$, on en déduit que $u_n < \frac{1}{n}$. Notons par ailleurs que $f_n(0) = -1$, donc par un raisonnement similaire on a toujours $0 < u_n$. Le théorème des gendarmes permet donc d'affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Démonstration subsidiaire : monotonie de la suite (u_n) . Pour déterminer la monotonie de la suite (u_n) , il faut réussir à comparer u_n et u_{n+1} . Pour cela, dans le même esprit que les calculs précédents, on va chercher à calculer $f_n(u_n)$ et $f_n(u_{n+1})$. Le morceau facile, c'est $f_n(u_n) = 0$ (par définition). Plus compliqué, $f_n(u_{n+1}) = u_{n+1}^5 + nu_{n+1} - 1$. Or, on sait que, par définition, $f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$, c'est-à-dire que $u_{n+1}^5 + (n+1)u_{n+1} - 1 = 0$, ou encore en développant $u_{n+1}^5 + nu_{n+1} + u_{n+1} - 1 = 0$, soit $u_{n+1}^5 + nu_{n+1} - 1 = -u_{n+1}$. Autrement dit, en reprenant le calcul précédent, $f_n(u_{n+1}) = -u_{n+1} < 0$ (puisque on a prouvé plus haut que tous les termes de la suite étaient positifs). En particulier, $f_n(u_{n+1}) < f_n(u_n)$. La fonction f_n étant strictement croissante, on en déduit que $u_{n+1} < u_n$, donc la suite (u_n) est décroissante.

4. On sait que $u_n^5 + nu_n - 1 = 0$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^5 = 0$ (puisque la suite (u_n) tend vers 0), donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = 1$.

Exercice 11 (***)

- Sur $\mathbb{R}^{+*}$, les fonctions f_n sont strictement croissantes comme sommes de fonctions croissantes. De plus, $f_n(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$. La fonction f_n effectue donc une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $[1; +\infty[$, et en particulier 2 admet un unique antécédent par f_n , que l'on peut donc noter u_n .
- On a déjà vu que $f_n(0) = 1$, donc $u_n > 0$, et $f_n(1) = n+1 > f_n(u_n)$ si $n \geq 2$. Par croissance de la fonction f_n , on a donc bien $u_n < 1$.
- On peut utiliser la méthode classique : $f_{n+1}(x) = f_n(x) + x^{n+1}$, donc $f_{n+1}(u_n) = f_n(u_n) + u_n^{n+1} = 2 + u_n^{n+1}$. Comme $u_n > 0$, $u_n^{n+1} > 0$, et $f_{n+1}(u_n) > 2 = f_{n+1}(u_{n+1})$. Par croissance de la fonction f_{n+1} , on déduit que $u_n > u_{n+1}$, et la suite est donc décroissante. Comme elle est minorée par 0, elle converge.
- Nos connaissances sur les suites géométriques nous permettent d'affirmer que, $\forall x \neq 1$, $f_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$. En particulier, $\frac{1-u_n^{n+1}}{1-u_n} = 2$. Or, comme la suite (u_n) est décroissante, on aura $\forall n \geq 2$, $u_n \leq u_2 < 1$, donc $0 < u_n^{n+1} < u_2^{n+1}$, avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{n+1} = 0$. Une petite application du théorème des gendarmes permet donc d'affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{n+1} = 0$. En passant à la limite la relation obtenue ci-dessus, et en notant l la limite inconnue de la suite (u_n) , on trouve alors $\frac{1}{1-l} = 2$, soit $1-l = \frac{1}{2}$ et $l = \frac{1}{2}$. On a prouvé que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$.
- Je vois venir d'ici ceux qui se sont lancés dans une récurrence inutile pour cette question. Reprenons donc les calculs des questions précédentes : $\frac{1-u_n^{n+1}}{1-u_n} = 2$, donc $1-u_n^{n+1} = 2-2u_n$, ou encore $u_n^{n+1} = 2u_n - 1$. Comme $v_n + \frac{1}{2} = u_n$, cela revient à dire que $\left(\frac{1}{2} + v_n\right)^{n+1} = 2v_n$.

Exercice 12 (**)

- Inutile de calculer la moindre dérivée, on sait que l'exponentielle est croissante que la fonction $x \mapsto \frac{1}{nx}$ est décroissante, donc g_n est croissante sur $]0, +\infty[$. De plus, $\lim_{x \rightarrow 0} g_n(x) = -\infty$, et

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = +\infty$ (aucune forme indéterminée), et la fonction g_n est bien sûr continue, elle est donc bijective de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$ et en particulier s'annule une seule fois sur cet intervalle.

2. L'inégalité $u_n > 0$ est évidente. De plus, $g_n\left(\frac{1}{n}\right) = e^{\frac{1}{n}} - 1 > 0$, puisque $e^{\frac{1}{n}} > e^0 = 1$. La fonction g_n étant strictement croissante, on en déduit que $u_n < \frac{1}{n}$. Une application immédiate du théorème des gendarmes donne alors $\lim u_n = 0$.
3. On calcule donc $g_{n+1}(x) - g_n(x) = e^x - \frac{1}{(n+1)x} - e^x + \frac{1}{nx} = \frac{-n + n+1}{n(n+1)x} = \frac{1}{n(n+1)x} > 0$. Cette expression est manifestement positive sur notre intervalle, ce qui implique que $g_{n+1}(u_{n+1}) - g_n(u_{n+1}) > 0$. Comme $g_{n+1}(u_{n+1}) = 0$ par définition de la suite, on a donc $g_n(u_{n+1}) < 0$, et en particulier $g_n(u_{n+1}) < g_n(u_n)$. La fonction g_n étant toujours croissante, on en déduit que $u_{n+1} < u_n$, et la suite (u_n) est donc décroissante.
4. Par définition, $g_n(u_n) = 0$, donc $e^{u_n} - \frac{1}{nu_n} = 0$. Autrement dit, $nu_n = \frac{1}{e^{u_n} - 1}$. Comme on sait que la suite (u_n) tend vers 0, on en déduit immédiatement que $\lim nu_n = 1$.

Exercice 13 (***)

1. Par définition, u_1 est solution positive de l'équation $x^2 - 2x - 1 = 0$, qui a pour discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8$, et admet donc pour solutions $x_1 = \frac{2 - \sqrt{8}}{2} = 1 - \sqrt{2} < 0$ (on oublie donc) et $x_2 = \frac{2 + \sqrt{8}}{2} = 1 + \sqrt{2}$. Puisque $u_1 > 0$, on a donc $u_1 = 1 + \sqrt{2}$.
2. La fonction f_n étant polynomiale, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $f'_n(x) = n(n+1)x^n - (n+1)nx^{n-1} = n(n+1)x^{n-1}(x-1)$. Comme $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = n - (n+1) = -1$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = +\infty$, on peut dresser le tableau de variations suivant :

x	0	1	$+\infty$
f_n	0	-1	$+\infty$

La fonction f_n ne prend que des valeurs négatives sur l'intervalle $[0, 1]$, l'équation $f_n(x) = 1$ ne peut pas y avoir de solution. Sur $[1, +\infty[$, f_n est croissante et continue, donc bijective vers son intervalle image $[-1, +\infty[$. Comme 1 appartient à cet intervalle image, l'équation $f_n(x) = 1$ admet donc une unique solution sur $[1, +\infty[$, et par conséquent sur $[0, +\infty[$.

3. Pour montrer un tel encadrement, on calcule les images des encadrants par f_n : $f_n\left(1 + \frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} - (n+1)\left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} - \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = 0$; et $f_n\left(1 + \frac{2}{n}\right) = n\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n+1} - (n+1)\left(\frac{n+2}{n}\right)^n = (n+2)\left(\frac{n+2}{n}\right)^n - (n+1)\left(\frac{n+2}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n > 1$. Comme $f_n\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < f_n\left(1 + \frac{2}{n}\right)$, la croissance de f_n sur l'intervalle $[1, +\infty[$ (intervalle auquel appartiennent $1 + \frac{1}{n}$, u_n et $1 + \frac{2}{n}$) assure que $1 + \frac{1}{n} < u_n < 1 + \frac{2}{n}$. Le théorème des gendarmes permet alors de dire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.
4. On commence par écrire $v_n = e^{n \ln(1 + \frac{\beta}{n})}$ pour se rendre compte qu'il y a une forme indéterminée si jamais ça ne nous frappe pas sous la forme initiale. On peut ensuite poser $x = \frac{\beta}{n}$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\beta}{n} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ (limite classique issue d'un taux d'accroissement), on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n \ln(1 + \frac{\beta}{n})}{\beta} = 1$. Ce qui se trouve dans notre exponentielle a donc pour limite β , et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e^\beta$.

5. On écrit $f_n \left(1 + \frac{\beta}{n}\right) = n \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^{n+1} - (n+1) \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^n = (n+\beta) \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^n - (n+1) \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^n = (\beta-1)v_n$. D'après la question précédente, notre suite converge donc vers $(\beta-1)e^\beta$.
6. Posons donc $g(x) = (x-1)e^x$, la fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Cette dérivée est du signe de x , on calcule donc $g(0) = -e^0 = -1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ (croissance comparée classique), et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, pour dresser le tableau suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
g	0	-1	$+\infty$

On conclut comme à la question 2 : la fonction g ne peut pas prendre la valeur 1 sur $] -\infty, 0]$, puis elle est bijective de $[0, +\infty[$ vers $[-1, +\infty[$, donc l'équation $g(x) = 1$ admet une unique solution. Comme de plus $g(1) = 0 < 1$ et $g(2) = e^2 > 1$, la croissance de g sur $[0, +\infty[$ assure que $1 < \alpha < 2$.

7. (a) Il suffit de recopier le résultat de la question 4 : $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \left(1 + \frac{\alpha - \varepsilon}{n}\right) = (\alpha - \varepsilon - 1)e^{\alpha - \varepsilon}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n \left(1 + \frac{\alpha + \varepsilon}{n}\right) = (\alpha + \varepsilon - 1)e^{\alpha + \varepsilon}$.
- (b) Par hypothèse, $1 < \alpha - \varepsilon < \alpha < \alpha + \varepsilon$, donc $g(\alpha - \varepsilon) < g(\alpha) < g(\alpha + \varepsilon)$ (par croissance de la fonction g étudiée plus haut sur $[1, +\infty[$). On en déduit que les deux limites calculées à la question précédente sont respectivement strictement inférieure à 1 et strictement supérieure à 1. Mais, en appliquant la définition de la limite, une suite qui a une limite strictement inférieure à 1 prend nécessairement des valeurs inférieures ou égales à 1 à partir d'un certain rang (on note cette limite $1 - \eta$, avec $\eta > 0$, et on applique la définition de la limite à ce η). À partir d'un certain rang, on aura donc nécessairement $f_n \left(1 + \frac{\alpha - \varepsilon}{n}\right) \leq 1 = f_n(u_n)$, ce qui implique $1 + \frac{\alpha - \varepsilon}{n} \leq u_n$ par croissance de f_n sur $[1, +\infty[$, intervalle auquel appartiennent bien nos deux valeurs. On montre la deuxième inégalité de la même façon, et on en déduit un entier n_0 (le maximum des deux entiers obtenus pour chaque inégalité) à partir duquel l'encadrement souhaité sera vérifié.
- (c) On constate déjà que $1 + \frac{\alpha - \varepsilon}{n} \leq u_n \leq 1 + \frac{\alpha + \varepsilon}{n} \Leftrightarrow \frac{\alpha - \varepsilon}{n} \leq u_n - 1 \leq \frac{\alpha + \varepsilon}{n} \Leftrightarrow \alpha - \varepsilon \leq n(u_n - 1) \leq \alpha + \varepsilon$. D'après la question précédente, on peut alors dire que, $\forall \varepsilon \in]0, \alpha - 1[$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, $\alpha - \varepsilon \leq n(u_n - 1) \leq \alpha + \varepsilon$. C'est exactement la définition de la limite, qui permet de conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(u_n - 1) = \alpha$.