

# Programme de colle 8

Classe de PC

Semaine du lundi 17 au vendredi 21 novembre

## Liste des questions de cours

- Ensemble de définition et caractère  $\mathcal{C}^1$  de  $x \mapsto f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos(xt) dt$ . Équation différentielle vérifiée par  $f$ , expression de  $f$  sans intégrale.
- Si  $f$  et  $g$  sont deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  continues,  $f$  intégrable sur  $\mathbb{R}$ , et  $g$  bornée, montrer que  $f * g$  est définie, continue et bornée. Si  $g$  est  $\mathcal{C}^1$  et  $g'$  bornée,  $f * g$  est  $\mathcal{C}^1$  et expression de  $(f * g)'$ .
- Pour tout  $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$  qui commutent,  $g(\text{Ker } f) \subset \text{Ker } f$  et  $g(\text{Im } f) \subset \text{Im } f$ .
- Pour tout  $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$ ,  $\text{Ker}(v \circ u) = \text{Ker } u \iff \text{Ker } v \cap \text{Im } u = \{0\}$
- Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$ ,  $x \in E$  et  $n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $f^{n-1}(x) \neq 0$  et  $f^n(x) = 0$ .  
Montrer que  $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$  est libre.

## 1 Intégrales à paramètres

Ensemble de définition, théorème de continuité sous le signe somme, théorème de convergence dominée à paramètre continu, théorème de Leibniz de dérivation sous le signe somme, cas des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$ .

## 2 Généralités sur les espaces vectoriels

### 2.1 Structure algébrique

**Caractérisation d'un sous-espace vectoriel, d'un morphisme d'espace vectoriel.**

Caractérisation de  $\text{Vect}(x_1, \dots, x_k)$  à l'aide des combinaisons linéaires.

Produits, sommes et sommes directes finies de sous-espaces vectoriels. Projecteurs et symétries.

Sous-espaces stables. Polynômes d'endomorphismes : polynôme annulateur, calcul d'inverse et de puissances.

### 2.2 Familles et bases

Définition des familles libres, familles liées, famille génératrices, bases. Théorème de la base incomplète.

Base canonique de  $\mathbb{K}[X]$ . Toute famille de polynômes non nuls échelonnée en degré est libre. Base de  $\mathbb{K}_n[X]$  des polynômes interpolateurs de Lagrange.

Morphismes et bases : si  $(e_i)_{i \in I}$  est une base de  $E$ , alors  $u : E \rightarrow E'$  est entièrement déterminé par la famille  $(u(e_i))_{i \in I}$ . Caractérisation des injections, surjections et bijections.

### 2.3 Dimension finie

Définition d'un espace vectoriel de dimension finie. Caractérisation d'une base.

Base adaptée à une décomposition en somme directe. Caractérisation de  $F = F_1 \oplus F_2$ .

$\dim \left( \sum_{i=1}^k F_i \right) \leq \sum_{i=1}^k \dim F_i$ , avec égalité si et seulement si la somme est directe.

Rang d'une famille de vecteurs. **Théorème du rang**.

Méthode : Détermination de la base d'un noyau, via la résolution d'un système.