Quelques aspects des cartes aléatoires

Jérémie Bouttier, Emmanuel Guitter

Institut de physique théorique, CEA Saclay
Département de mathématiques et applications, ENS Paris

Journées de physique statistique, 31 janvier 2014

Des cartes ?

Une **carte plane** est un réseau 2D irrégulier. Mathématiquement c'est un graphe dessiné dans la sphère sans croisement d'arêtes, considéré à déformation près. Une carte est formée de **sommets**, d'**arêtes** et de **faces**.

Des cartes ?

Une **carte plane** est un réseau 2D irrégulier. Mathématiquement c'est un graphe dessiné dans la sphère sans croisement d'arêtes, considéré à déformation près. Une carte est formée de **sommets**, d'**arêtes** et de **faces**.

Des cartes ?

Une **carte plane** est un réseau 2D irrégulier. Mathématiquement c'est un graphe dessiné dans la sphère sans croisement d'arêtes, considéré à déformation près. Une carte est formée de **sommets**, d'**arêtes** et de **faces**.

On s'intéressera particulièrement à certaines familles de cartes, comme les triangulations et **quadrangulations**, plus simples à étudier mais donnant accès à des propriétés **universelles**.

Quelques motivations

- Combinatoire (énumération, théorème des quatre couleurs)

Quelques motivations

- Combinatoire (énumération, théorème des quatre couleurs)
- Matrices aléatoires (développement topologique des intégrales matricielles)

Quelques motivations

- Combinatoire (énumération, théorème des quatre couleurs)
- Matrices aléatoires (développement topologique des intégrales matricielles)
- Gravité quantique bidimensionnelle (*“develop an art of handling sums over random surfaces”*)

...

Quelques motivations

- Combinatoire (énumération, théorème des quatre couleurs)
- Matrices aléatoires (développement topologique des intégrales matricielles)
- Gravité quantique bidimensionnelle (*“develop an art of handling sums over random surfaces”*)
- Maths (géométrie algébrique, théorie des représentations...)

...

Quelques motivations

- Combinatoire (énumération, théorème des quatre couleurs)
- Matrices aléatoires (développement topologique des intégrales matricielles)
- Gravité quantique bidimensionnelle (*“develop an art of handling sums over random surfaces”*)
- Maths (géométrie algébrique, théorie des représentations...)
- **Géométrie aléatoire**

...

...

Géométrie aléatoire

Images : Nicolas Curien

Géométrie aléatoire

Images : Nicolas Curien

Géométrie aléatoire

Images : Nicolas Curien

Fonction à deux points

Une question simple

Prenons une quadrangulation aléatoire à n faces (donc $n + 2$ sommets). Tirons deux sommets au hasard v_1 et v_2 . Quelle est la loi de la distance de graphe d_{12} entre eux ?

Problème équivalent

Compter les quadrangulations à n faces et deux sommets marqués à distance donnée d_{12} .

Fonction à deux points

Notre premier ingrédient est la **bijection de Schaeffer** entre quadrangulations à n faces et arbres bien étiquetés à n arêtes.

Fonction à deux points

Notre premier ingrédient est la **bijection de Schaeffer** entre quadrangulations à n faces et arbres bien étiquetés à n arêtes.

- entiers strictement positifs sur les sommets (*distances!*)
- variant de 0, +1 ou -1 le long des arêtes

Fonction à deux points

À l'aide de cette bijection on obtient facilement une équation codant la solution de notre problème.

Fonction à deux points

À l'aide de cette bijection on obtient facilement une équation codant la solution de notre problème. On note $R_{\ell;n}$ le nombre d'arbres à n arêtes d'étiquette racine ℓ et on introduit la série génératrice

$$R_{\ell}(g) = \sum_{n \geq 0} g^n R_{\ell;n}.$$

Fonction à deux points

À l'aide de cette bijection on obtient facilement une équation codant la solution de notre problème. On note $R_{\ell;n}$ le nombre d'arbres à n arêtes d'étiquette racine ℓ et on introduit la série génératrice

$$R_{\ell}(g) = \sum_{n \geq 0} g^n R_{\ell;n}.$$

Celle-ci satisfait l'équation

$$R_{\ell} = \begin{cases} 1 + gR_{\ell}(R_{\ell+1} + R_{\ell} + R_{\ell-1}), & \ell \geq 1 \\ 0 & \ell = 0. \end{cases}$$

Fonction à deux points

Notre second ingrédient est l'**intégrabilité** de l'équation obtenue.

Fonction à deux points

Notre second ingrédient est l'**intégrabilité** de l'équation obtenue. Celle-ci admet pour solution

$$R_\ell = R \frac{(1 - x^\ell)(1 - x^{\ell+3})}{(1 - x^{\ell+1})(1 - x^{\ell+2})}$$

où les quantités $R = R(g)$ et $x = x(g)$ sont solution de

$$R = 1 + 3gR^2, \quad x + \frac{1}{x} + 1 = \frac{1}{gR^2}.$$

(B.-Di Francesco-Guitter '03)

Fonction à deux points

Notre second ingrédient est l'**intégrabilité** de l'équation obtenue. Celle-ci admet pour solution

$$R_\ell = R \frac{(1 - x^\ell)(1 - x^{\ell+3})}{(1 - x^{\ell+1})(1 - x^{\ell+2})}$$

où les quantités $R = R(g)$ et $x = x(g)$ sont solution de

$$R = 1 + 3gR^2, \quad x + \frac{1}{x} + 1 = \frac{1}{gR^2}.$$

(B.-Di Francesco-Guitter '03)

Il y a bien intégrabilité au sens où l'équation admet une **intégrale première**

$$\psi(R_\ell, R_{\ell+1}) := (1 - gR_\ell - gR_{\ell+1})(1 + gR_\ell R_{\ell+1}).$$

ne dépendant pas de ℓ .

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question !

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question ! Par exemple, on trouve le nombre moyen de sommets à distance d_{12} d'un point fixé dans une quadrangulation de taille n donnée.

$$n = 50$$

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question ! Par exemple, on trouve le nombre moyen de sommets à distance d_{12} d'un point fixé dans une quadrangulation de taille n donnée.

$$n = 100$$

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question ! Par exemple, on trouve le nombre moyen de sommets à distance d_{12} d'un point fixé dans une quadrangulation de taille n donnée.

$$n = 150$$

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question ! Par exemple, on trouve le nombre moyen de sommets à distance d_{12} d'un point fixé dans une quadrangulation de taille n donnée.

$$n = 200$$

Fonction à deux points

On a ainsi une réponse **exacte** à notre question ! Par exemple, on trouve le nombre moyen de sommets à distance d_{12} d'un point fixé dans une quadrangulation de taille n donnée.

$$d_{12} \sim n^{1/4}$$

Fonction à deux points

La fonction d'échelle est donnée par $\rho(L) = \Phi'(L)$ avec

$$\Phi(L) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \xi^2 e^{-\xi^2} \left(1 + \frac{3}{\sinh^2(L\sqrt{-3i\xi/2})} \right)$$

(Ambjørn-Watabiki '96, B.-Di Francesco-Guitter '03)

Fonction à deux points

La fonction d'échelle est donnée par $\rho(L) = \Phi'(L)$ avec

$$\Phi(L) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \xi^2 e^{-\xi^2} \left(1 + \frac{3}{\sinh^2(L\sqrt{-3i\xi/2})} \right)$$

(Ambjørn-Watabiki '96, B.-Di Francesco-Guitter '03)

C'est une quantité universelle caractéristique de la **carte brownienne**, limite d'échelle des cartes planaires (Marckert-Mokkadem '05, Le Gall '06-'11, Miermont '07-'11...)

Fonction à deux points

La fonction d'échelle est donnée par $\rho(L) = \Phi'(L)$ avec

$$\Phi(L) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \xi^2 e^{-\xi^2} \left(1 + \frac{3}{\sinh^2(L\sqrt{-3i\xi/2})} \right)$$

(Ambjørn-Watabiki '96, B.-Di Francesco-Guitter '03)

C'est une quantité universelle caractéristique de la **carte brownienne**, limite d'échelle des cartes planaires (Marckert-Mokkadem '05, Le Gall '06-'11, Miermont '07-'11...)

$$\Phi(L) \sim \frac{3D^4}{28}, L \rightarrow 0 \quad \log(1 - \Phi(L)) \sim \text{cst.} L^{4/3}, L \rightarrow \infty.$$

Fonction à deux points

On peut dépasser le cadre des quadrangulations grâce à une généralisation de la bijection de Schaffer faisant intervenir des “mobiles”.

(B.-Di Francesco-Guitter '04)

On peut ainsi valider l'hypothèse d'universalité, la propriété d'intégrabilité restant vraie dans le cadre général.

Autres résultats

On peut ensuite considérer la **fonction à trois points**.

(B.-Guitter '08)

Autres résultats

On peut ensuite considérer la **fonction à trois points**.

(B.-Guitter '08)

Il faut de nouveaux outils :

- nouvelle bijection (Miermont)
- paramétrisation astucieuse des distances

$$d_{12} = s + t$$

$$d_{23} = t + u$$

$$d_{31} = u + s$$

- autres expressions exactes (intégrabilité)

Autres résultats

On peut ensuite considérer la **fonction à trois points**.

(B.-Guitter '08)

Il faut de nouveaux outils :

- nouvelle bijection (Miermont)
- paramétrisation astucieuse des distances

$$d_{12} = s + t$$

$$d_{23} = t + u$$

$$d_{31} = u + s$$

- autres expressions exactes (intégrabilité)

Fonction à trois points

Il s'agit d'énumérer des **cartes bien étiquetées** contraintes.

Série génératrice : $G_{s,t,u}(g)$ où g poids par arête

Fonction à trois points

Une telle carte est faite d'arbres attachés à un squelette.

(On réutilise l'expression précédente de R_ℓ)

Fonction à trois points

On peut en faire une décomposition naturelle...

Fonction à trois points

... et obtenir des composantes acycliques.

Fonction à trois points

$X_{s,t}$

$X_{t,u}$

$X_{u,s}$

“Chaînes”

Fonction à trois points

$$Y_{s,t,u}$$

$$X_{s,t}$$

$$X_{t,u}$$

$$X_{u,s}$$

$$Y_{s,t,u}$$

“Étoiles”

Fonction à trois points

$$Y_{s,t,u}$$

$$X_{s,t}$$

$$X_{t,u}$$

$$X_{u,s}$$

$$Y_{s,t,u}$$

“Étoiles”

$$F_{s,t,u} = X_{s,t}X_{t,u}X_{u,s}(Y_{s,t,u})^2$$

La fonction à trois points

Résultat final **exact** (B.-Gutierrez '08)

$$F_{s,t,u} = \frac{[3] ([s+1][t+1][u+1][s+t+u+3])^2}{[1]^3 [s+t+1][s+t+3][t+u+1][t+u+3][u+s+1][u+s+3]}$$

avec

$$[\ell] := \frac{(1-x^\ell)}{(1-x)}.$$

et $x + 1/x + 1 = 1/(gR^2)$ comme avant.

La fonction à trois points

Résultat final **exact** (B.-Gutierrez '08)

$$F_{s,t,u} = \frac{[3] ([s+1][t+1][u+1][s+t+u+3])^2}{[1]^3 [s+t+1][s+t+3][t+u+1][t+u+3][u+s+1][u+s+3]}$$

avec

$$[\ell] := \frac{(1-x^\ell)}{(1-x)}.$$

et $x + 1/x + 1 = 1/(gR^2)$ comme avant.

NB : on se sait pas encore étendre à quatre points ou plus.

La fonction à trois points

Résultat final **exact** (B.-Gutter '08)

$$F_{s,t,u} = \frac{[3] ([s+1][t+1][u+1][s+t+u+3])^2}{[1]^3 [s+t+1][s+t+3][t+u+1][t+u+3][u+s+1][u+s+3]}$$

avec

$$[\ell] := \frac{(1-x^\ell)}{(1-x)}.$$

et $x + 1/x + 1 = 1/(gR^2)$ comme avant.

NB : on se sait pas encore étendre à quatre points ou plus.

Limite d'échelle : les distances sont d'ordre $n^{1/4}$ pour n grand et on obtient la distribution jointe **universelle** des distances renormalisées

$$D_{12} = \frac{d_{12}}{n^{1/4}}, \quad D_{23} = \frac{d_{23}}{n^{1/4}}, \quad D_{31} = \frac{d_{31}}{n^{1/4}}.$$

La fonction à trois points

$$D_{12} = 0.8$$

Densité de deux distances conditionnellement à la troisième.

La fonction à trois points

$$D_{12} = 1.5$$

Densité de deux distances conditionnellement à la troisième.

La fonction à trois points

Densité de deux distances conditionnellement à la troisième.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Le Gall ('08) a mis en évidence le surprenant phénomène de **confluence** des géodésiques dans la limite d'échelle.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Le Gall ('08) a mis en évidence le surprenant phénomène de **confluence** des géodésiques dans la limite d'échelle.

On sait calculer la distribution de δ pour trois points aléatoires.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

$\rho(\Delta_{12})$

Δ_{12}

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les triangles ont 6 côtés !

$$\rho(\delta_1, \delta_2 | D_{12})$$

$$D_{12} = 1$$

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

$$\rho(\delta_1, \delta_2 | D_{12})$$

$$D_{12} = 2$$

Autres résultats (B.-Guitter '08)

Dans une grande carte aléatoire les **triangles** ont 6 côtés !

$$\rho(\delta_1, \delta_2 | D_{12})$$

$$D_{12} = 5$$

Autres résultats (B.-Guitter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Guitter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Gutter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Gutter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Autres résultats (B.-Gutter '08)

On peut également étudier les **boucles séparantes**.

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Guitter '10)

En étudiant les cartes à bord, on s'est aperçu de la coïncidence suivante : si on note $\omega_{2p}(g)$ la série génératrice des **quadrangulations à bord** de longueur $2p$ (bien connue depuis 1960) et qu'on introduit la **résolvante**

$$\omega(z) = \sum_{p \geq 0} \omega_{2p} z^{2p}$$

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Guitter '10)

En étudiant les cartes à bord, on s'est aperçu de la coïncidence suivante : si on note $\omega_{2p}(g)$ la série génératrice des **quadrangulations à bord** de longueur $2p$ (bien connue depuis 1960) et qu'on introduit la **résolvante**

$$\omega(z) = \sum_{p \geq 0} \omega_{2p} z^{2p}$$

alors la fonction à deux points apparaît dans le développement en **fraction continue** de $\omega(z)$!

$$\omega(z) = \frac{1}{1 - \frac{R_1 z^2}{1 - \frac{R_2 z^2}{1 - \dots}}}$$

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Guitter '10)

À nouveau cela reste vrai dans un cadre plus général que celui des quadrangulations.

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Gutierrez '10)

À nouveau cela reste vrai dans un cadre plus général que celui des quadrangulations.

$$R_\ell = R \frac{\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + 1 + n]_m \det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell - 1 + n]_m}{\left(\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + n]_m \right)^2}$$
$$S_\ell = S - \sqrt{R} \left(\frac{\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + 1 + n - \delta_{n,1}]_m}{\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + 1 + n]_m} - \frac{\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + n - \delta_{n,1}]_m}{\det_{1 \leq m, n \leq M} [\ell + n]_m} \right)$$

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Guitter '10)

Origine combinatoire de l'intégrabilité (B.-Guitter '10)

La suite ?

On obtient de nombreux résultats caractérisant la **carte brownienne**, classe d'universalité de cartes aléatoires.

La suite ?

On obtient de nombreux résultats caractérisant la **carte brownienne**, classe d'universalité de cartes aléatoires. En existe-t-il d'autres ? Oui si on considère des cartes décorées par un modèle de physique statistique !

La suite ?

On obtient de nombreux résultats caractérisant la **carte brownienne**, classe d'universalité de cartes aléatoires. En existe-t-il d'autres ? Oui si on considère des cartes décorées par un modèle de physique statistique !

Aux points critiques la classe d'universalité est différente.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Notre approche repose sur une décomposition **combinatoire** simple : on part d'une **configuration** du modèle $O(n)$.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Les faces visitées par une boucle forment un **collier**.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

On coupe le long des contours des boucles extérieures.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

La partie externe forme le **tamis** (*gasket*).

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Chaque boucle externe forme un **collier** formé de polygones collés bord à bord.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Chaque boucle externe contient une **configuration interne** de même nature que la configuration de départ.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Résultats :

- on déduit une équation fonctionnelle permettant de calculer la **fonction de partition** du modèle,
- on détermine le diagramme de phase **exact**,
- on caractérise la **géométrie du tamis** aux points critiques.

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Résultats :

- on déduit une équation fonctionnelle permettant de calculer la **fonction de partition** du modèle,
- on détermine le diagramme de phase **exact**,
- on caractérise la **géométrie du tamis** aux points critiques. Elle coïncide avec celle des cartes à **grandes faces** (Le Gall-Miermont '09).

Le modèle $O(n)$ sur les cartes aléatoires (Borot-B.-Guitter '11-'12)

Résultats :

- on déduit une équation fonctionnelle permettant de calculer la **fonction de partition** du modèle,
- on détermine le diagramme de phase **exact**,
- on caractérise la **géométrie du tamis** aux points critiques. Elle coïncide avec celle des cartes à **grandes faces** (Le Gall-Miermont '09). La dimension fractale est différente du 4 de la carte brownienne et vaut

$$d_H = 3 \pm \frac{2}{\pi} \arccos\left(\frac{n}{2}\right), \quad n \in (0, 2).$$

Merci !