Devoir de Mathématiques numéro 1

Correction

Exercice 1 (E3A MP 2017)

- 1) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $S_3'(x) = 1 + \frac{2x}{2} + \frac{3x}{3!} = S_2(x)$.
Comme $\Delta = 1 - 4/2 = -1 < 0$, $S_2(x)$ n'a pas de racines réelles et est donc de signe constant.

x	$-\infty$	$+\infty$
$S_2(x)$	+	
S_3	$-\infty$	$+\infty$

Positions relatives :

- Pour les x positifs ou nuls :

$$e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} = S_3(x) + \underbrace{\sum_{k=4}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}}_{\geq 0} \geq S_3(x)$$

Donc la courbe de l'exponentielle est au-dessus de celle de S_3 . De même,

$$S_3(x) = S_1(x) + \underbrace{\sum_{k=2}^3 \frac{x^k}{k!}}_{\geq 0} \geq S_1(x)$$

Donc la courbe de S_3 est au-dessus de celle de S_1 .

- Pour les x négatifs ou nuls : Posons

$$g(x) = e^x - S_3(x)$$

La fonction g est $\mathcal{C}^\infty$, et $\forall x \in \mathbb{R}_-$, $g'(x) = e^x - S_2(x)$, $g''(x) = e^x - S_1(x)$ et $g'''(x) = e^x - 1 \leq 0$.
Donc g'' est décroissante sur $\mathbb{R}_-$, or $g''(0) = 0$, donc $g'' \geq 0$: la courbe de l'exponentielle est au-dessus de celle de S_1 (résultat classique).

De plus, comme $g'' \geq 0$, g' est croissante sur $\mathbb{R}_-$, or $g'(0) = 0$, donc $g' \leq 0$. Ainsi g est décroissante sur $\mathbb{R}_-$, or $g(0) = 0$, donc $g \geq 0$: la courbe de l'exponentielle est au-dessus de celle de S_3 .

Pour étudier des positions relative, on pose $g = f_1 - f_2$ et on étudie le signe. Pour étudier un signe, au besoin, on fait un tableau de variations. Etc..

De plus,

$$S_3(x) - S_1(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} = \frac{x^2}{2} \left(1 + \frac{x}{3} \right)$$

La parenthèse est positive si et seulement si $x \geq -3$, donc la courbe de S_3 est au-dessus de celle de S_1 sur $[-3, 0]$ (et même $[-3, +\infty[$, mais je m'intéresse ici aux $x \leq 0$), et en-dessous sur $] -\infty, -3]$.

2) Montrons par récurrence que la propriété :

$\mathcal{H}_n$: S_{2n} n'a pas de racine réelle et S_{2n+1} a une unique racine réelle simple.

est vraie pour tout $n \geq 0$.

- $\mathcal{H}_0$: $S_0 = 1$ n'a pas de racine réelle et $S_1 = 1 + X$ a une unique racine réelle simple ($x = -1$).
Donc $\mathcal{H}_0$ est vraie.
- $\mathcal{H}_n \implies \mathcal{H}_{n+1}$: Supposons $\mathcal{H}_n$ vraie :

S_{2n} n'a pas de racine réelle et S_{2n+1} a une unique racine réelle α_{2n+1} simple.

Le coefficient dominant de S_{2n+1} étant $\frac{1}{(2n+1)!} > 0$, nous avons le tableau de signe de $S_{2n+1}(x)$.

De plus, on remarque que $S'_{2n+2} = S_{2n+1}$ et $S'_{2n+3} = S_{2n+2}$. D'où les tableaux de signes et de variations suivants :

x	$-\infty$	α_{2n+1}	$+\infty$
signe de $S_{2n+1}(x)$		-	0
S_{2n+2}	$+\infty$		$+\infty$
signe de $S_{2n+2}(x)$			+
S_{2n+3}	$-\infty$		$+\infty$

$S_{2n+2}(\alpha_{2n+1}) > 0$

Comme $S_{2n+2} = S_{2n+1} + \frac{X^{2n+2}}{(2n+2)!}$ et $S_{2n+1}(\alpha_{2n+1}) = 0$, $S_{2n+2}(\alpha_{2n+1}) = \frac{(\alpha_{2n+1}^{n+1})^2}{(2n+2)!} > 0$.

Donc, dans un premier temps, S_{2n+2} n'a pas de racine réelle.

De plus la fonction S_{2n+3} est polynomiale donc continue sur l'intervalle $\mathbb{R}$, strictement croissante, et $\lim_{-\infty} S_{2n+3} < 0$, $\lim_{+\infty} S_{2n+3} > 0$. Donc, d'après le théorème de la bijection, $S_{2n+3}(x) = 0$ a une unique solution.

En d'autres termes, S_{2n+3} a une unique racine réelle. Si cette racine α_{2n+3} était double, alors $S'_{2n+3}(\alpha_{2n+3}) = 0$. Or $S'_{2n+3} = S_{2n+2}$, qui n'a pas de racines réelles.

Donc $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie.

- **Conclusion :** $\forall n \geq 0$ S_{2n} n'a pas de racine réelle et S_{2n+1} a une unique racine réelle simple.

- 3) a) Par définition, $S_{2n-1}(\alpha_{2n-1}) = 0$ et $S_{2n+1} = S_{2n-1} + \frac{X^{2n}}{(2n)!} + \frac{X^{2n+1}}{(2n+1)!}$. Ainsi,

$$S_{2n+1}(\alpha_{2n-1}) = \frac{\alpha_{2n-1}^{2n}}{(2n)!} + \frac{\alpha_{2n-1}^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{\alpha_{2n-1}^{2n}}{(2n)!} \underbrace{\left(1 + \frac{\alpha_{2n-1}}{2n+1}\right)}_{>0}$$

Or, d'après l'énoncé, pour tout $n \geq 2$, les racines de S_n sont de module strictement plus petit que n . Donc $\alpha_{2n-1} > -(2n+1)$, et $\left(1 + \frac{\alpha_{2n-1}}{2n+1}\right) > 0$. Ainsi, $S_{2n+1}(\alpha_{2n-1}) > 0$.

De plus, d'après 2), S_{2n+1} est strictement croissante, donc $S_{2n+1}(\alpha_{2n+1}) = 0 < S_{2n+1}(\alpha_{2n-1})$ entraîne $\alpha_{2n+1} < \alpha_{2n-1}$.

Conclusion : La suite $(\alpha_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante

- b) i) Comme (v_m) converge, elle est bornée et en particulier $(|v_m|)$ est majorée. Soit A un majorant de $(|v_m|)$:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad |v_m| \leq A$$

D'après l'énoncé, $e^z = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$. Donc en particulier, $\sum \frac{A^k}{k!}$ converge, ce qui entraîne que la

suite des restes $\left(\sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}\right)_m$ converge vers 0 :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq M \implies \left| \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \right| < \varepsilon$$

Or $|S_m(v_m) - e^{v_m}| = \left| \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{v_m^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{|v_m|^k}{k!} \leq \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$. Soit ε un nombre réel > 0 .

$$\exists M \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq M \implies |S_m(v_m) - e^{v_m}| \leq \left| \sum_{k=m+1}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \right| < \varepsilon$$

Ainsi, **Il existe un entier naturel M tel que : $\forall m \in \mathbb{N}, m > M \implies |S_m(v_m) - e^{v_m}| < \varepsilon$**

- ii) Comme (v_m) converge vers ℓ , et que la fonction exponentielle est continue en ℓ , (e^{v_m}) converge vers e^ℓ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M' \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq M' \implies |e^{v_m} - e^\ell| < \varepsilon$$

Or d'après i),

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq M \implies |S_m(v_m) - e^{v_m}| < \varepsilon$$

Or $|S_m(v_m) - e^\ell| = |S_m(v_m) - e^{v_m} + e^{v_m} - e^\ell| \leq |S_m(v_m) - e^{v_m}| + |e^{v_m} - e^\ell|$. Donc avec $M'' = \max(M, M')$,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M'' \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq M'' \implies |S_m(v_m) - e^\ell| < 2\varepsilon$$

D'où **La suite $(S_m(v_m))_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers e^ℓ**

- c) Si (α_{2n+1}) converge vers ℓ , alors, d'après b), la suite $(S_{2n+1}(\alpha_{2n+1}))$, qui est la suite nulle, converge vers $e^\ell > 0$. Ce qui est absurde. Donc (α_{2n+1}) ne converge pas.

D'après a), (α_{2n+1}) est décroissante. Comme elle n'a pas de limite finie,

La suite $(\alpha_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$

- 4) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $h'(x) = (1-x)e^{1-x}$ qui est du signe de $(1-x)$.

La limite en $-\infty$ s'obtient par produit celle en $+\infty$ par la croissance comparée $te^t \xrightarrow[t \rightarrow -\infty]{} 0$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$h'(x)$	$+$	0	$-$
$h(x)$	$-\infty$	1	0

- 5) La fonction h est continue et strictement croissante sur $] -\infty, 1[$. De plus $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$. Donc h induit une bijection de $] -\infty, 1[$ vers $] -\infty, 1[$

On pose g la bijection réciproque qui est continue et strictement croissante

De plus h est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et h' ne s'annule pas sur $] -\infty, 1[$

donc g de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $] -\infty, 1[$ dans $] -\infty, 1[$ vérifiant $\forall x \in] -\infty, 1[, h(g(x)) = x$

Le graphe de g est obtenu par symétrie du graphe de f par rapport à la première bissectrice $y = -x$.

- 6) Comme h induit une bijection de $] -\infty, 1[$ vers $] -\infty, 1[$, il existe un unique $\rho \in] -\infty, 1[$ tel que $h(\rho) = -1$.

De plus $\forall x \geq 1, h(x) > 0$ ainsi il existe un unique nombre réel ρ tel que $h(\rho) = -1$

- 7) $h(-1/2) = -\frac{e^{3/2}}{2}$ donc $\ln(-h(-1/2)) = \frac{3}{2} - \ln(2) > 1 - \ln(2) > 0$ car $2 \leq e$

donc $-h(-1/2) > 1$ d'où $h(-1/2) < -1 = h(\rho)$

comme h est strictement croissante sur $] -\infty, 1[$ alors $-1/2 < \rho$

d'un autre côté $h(-1/4) = -\frac{e^{5/4}}{4}$

donc $\ln(-h(-1/4)) = \frac{5}{4} - 2\ln(2) \leq \frac{5}{4} - \frac{26}{20} = -\frac{1}{20} < 0$ car $\ln 2 \geq \frac{13}{20}$

donc $h(-1/4) > h(\rho)$

On a bien ρ dans l'intervalle $] -1/2, -1/4[$

- 8) a) Comme $e^{nz} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(nz)^k}{k!}$, d'après l'énoncé; on a l'existence de $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^{k-n}$ car

$$z^n \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^{k-n} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^k$$

d'où

$$(ze^{1-z})^n e^{-n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^{k-n} = e^{-nz} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^k = e^{-nz} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(nz)^k}{k!}$$

et

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(nz)^k}{k!} = e^{nz} - \sum_{k=0}^n \frac{(nz)^k}{k!} = e^{nz} - S_n(nz)$$

On a bien l'égalité :
$$1 - e^{-nz} T_n(z) = 1 - e^{-nz} S_n(nz) = (ze^{1-z})^n e^{-n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^{k-n}$$

b) Pour $k \geq n+1$, on a $\left| \frac{n^k}{k!} z^{k-n} \right| \leq \frac{n^k}{k!}$

et $\sum_{k \geq n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}$ est une série convergente (en prenant $z = 1$ dans la question précédente)

donc à l'aide de la question précédente et comme $|ze^{1-z}| \leq 1$ et $|z| \leq 1$:

$$|1 - e^{-nz} T_n(z)| = |ze^{1-z}|^n e^{-n} \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} z^{k-n} \right| \leq e^{-n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} |z|^{k-n} \leq e^{-n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!}$$

On obtient : $|1 - e^{-nz} T_n(z)| \leq 1 - e^{-n} T_n(1)$ car $1 - e^{-n} T_n(1) = (1e^{1-1})^n e^{-n} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{n^k}{k!} 1^{k-n}$

c) Par l'absurde si on avait $T_n(z) = 0$, on aurait $1 \leq 1 - e^{-n} T_n(1)$ d'après la question précédente donc $e^{-n} T_n(1) \leq 0$ donc $T_n(1) \leq 0$ ce qui est absurde

On en déduit que $T_n(z) \neq 0$

9) En reprenant le calcul du 3)a), on a pour $m \in \mathbb{N}$: $S_{2m+1}(X) = \sum_{p=0}^m \left(\frac{X^{2p}}{(2p)!} + \frac{X^{2p+1}}{(2p+1)!} \right)$

$$\text{Donc } S_{2m+1}(-2m-1) = \sum_{p=0}^m \frac{(2m+1)^{2p}}{(2p+1)!} (2p+1-2m-1)$$

donc pour n impair, on a $S_n(-n) < 0$ donc $-n < \alpha_n$ (admis par l'énoncé et vu en 3)
ainsi $-n < \alpha_n < 0$ en utilisant les variations de S_n vues au 2) or $0 = S_n(\alpha_n) = T_n(\alpha_n/n)$
donc d'après la contraposée de la question 8 : $|\alpha_n/n| > 1$ ou $|\alpha_n/n \exp(1 - \alpha_n/n)| > 1$
ainsi $|\alpha_n| > n$ ou $|h(\alpha_n/n)| > 1$

donc $|h(\alpha_n/n)| > 1$ et ainsi $h(\alpha_n/n) < -1 = h(\rho)$ car $-1 < \alpha_n/n < 0$

donc $\alpha_n/n < \rho$ d'où $\alpha_n \in]-n, n\rho[$

10) La fonction exp est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

On peut donc utiliser la formule de Taylor avec reste intégrale à l'ordre n . Soit $u \in \mathbb{R}$. On a

$$\exp(0) = \sum_{k=0}^n \frac{\exp^{(k)}(-u)}{k!} (0+u)^k + \int_{-u}^0 \frac{(0-t)^n}{n!} \exp^{(n+1)}(t) dt$$

$$\text{donc } 1 = e^{-u} \sum_{k=0}^n \frac{u^k}{k!} + \int_{-u}^0 \frac{(-t)^n}{n!} e^t dt$$

On effectue dans l'intégrale le changement de variable de classe $\mathcal{C}^1$: $x = -t$; $dx = -dt$

$$\text{ainsi } 1 = e^{-u} S_n(u) - \int_u^0 \frac{x^n}{n!} e^{-x} dx \text{ d'où } e^{-u} S_n(u) = 1 + \frac{1}{n!} \int_u^0 t^n e^{-t} dt$$

11) En utilisant la question précédente en $u = \alpha_n$, on a : $0 = 1 + \frac{1}{n!} \int_{\alpha_n}^0 x^n e^{-x} dx$

Comme $\alpha_n/n = \gamma_n$, on effectue le changement de variable de classe $\mathcal{C}^1$: $nt = x$; $n dt = dx$

donc $n \frac{1}{n!} \int_{\gamma_n}^0 (nt)^n e^{-nt} dt = -1$ et ainsi $-1 = \frac{n^{n+1}}{n!} \int_{\gamma_n}^0 (te^{-t})^n dt$ d'où $\int_{\gamma_n}^0 h(t)^n dt = -\frac{n!e^n}{n^{n+1}}$

12) Quand $m \rightarrow +\infty$, on pose $n = 2m + 1$ et $n \rightarrow +\infty$ et Stirling nous dit que : $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

donc $\int_{\gamma_n}^0 h(t)^n dt \sim -\sqrt{\frac{2\pi}{n}}$ et $-\sqrt{\frac{2\pi}{n}} \rightarrow 0$. D'où la suite $\left(\int_{\gamma_{2m+1}}^0 h(t)^{2m+1} dt\right)_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers 0

13) Pour $t \in]-\infty, 0]$, $h(t) \leq 0$ donc $h(t)^{2m+1} \leq 0$ et $\gamma_{2m+1} \leq \rho \leq 0$ (voir 9 et 7)

Ainsi les trois intégrales de la relation de Chasles sont négatives :

$$\int_{\gamma_{2m+1}}^0 h(t)^{2m+1} dt = \int_{\gamma_{2m+1}}^{\rho} h(t)^{2m+1} dt + \int_{\rho}^0 h(t)^{2m+1} dt$$

d'où $\int_{\gamma_{2m+1}}^0 h(t)^{2m+1} dt \leq \int_{\gamma_{2m+1}}^{\rho} h(t)^{2m+1} dt \leq 0$

Ainsi, par encadrement, la suite $\left(\int_{\gamma_{2m+1}}^{\rho} h(t)^{2m+1} dt\right)_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 selon 12

14) Comme h est strictement croissante sur $] -\infty, 1[$, on a $\forall t \leq \rho$, $h(t) \leq -1$ et $h(t)^{2m+1} \leq -1$

donc pour $m \geq 1$, comme on a $\gamma_{2m+1} \leq \rho$ on a $\int_{\gamma_{2m+1}}^{\rho} h(t)^{2m+1} dt \leq (\rho - \gamma_{2m+1}) \times (-1)$

donc $0 \leq \rho - \gamma_{2m+1} \leq -\int_{\gamma_{2m+1}}^{\rho} h(t)^{2m+1} dt$

Alors, par encadrement : $\gamma_{2m+1} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} \rho$ selon 13 d'où $\alpha_{2m+1}/(2m+1) \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} \rho$

donc $\alpha_{2m+1} \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} (2m+1)\rho$ D'où $\alpha_{2m+1} \underset{m \rightarrow +\infty}{\sim} 2m\rho$

Exercice 2 (CAPES 2009, partie I)

A. Intégrales de Wallis *cette partie est extrêmement classique, donc à connaître.*

Pour tout entier naturel n , on pose $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$.

1) a) Soit $n \geq 0$. On effectue le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$.

Donc $\cos(t) = \cos(\pi/2 - u) = \sin(u)$ et $dt = -du$.

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^n u (-1) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n u du$$

Remarque : t est une variable muette, comme k dans $\sum_{k=0}^n$. Elle n'existe qu'entre $\int$ et dt .

Ainsi on peut réutiliser cette variable un peu plus loin : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n u du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$.

Conclusion : $W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$

b) $W_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = [\sin t]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $t \in [0, \pi/2]$, $\cos^n t \geq 0$. Donc par croissance de l'intégrale, $W_n \geq 0$.

Supposons que $W_n = 0$. Puisque $t \mapsto \cos^n t$ est continue, alors $\cos^n t = 0$ pour tout $t \in [0, \pi/2]$, ce qui est absurde (par exemple $\cos 0 = 1$).

Ainsi, $W_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

c) Soit $n \geq 2$. Effectuons une intégration par parties :

$$\begin{aligned} W_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t \, dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t) \times (\cos^{n-1} t) \, dt \\ &= \left[(\sin t) \times (\cos^{n-1} t) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t) \left(-(n-1)(\sin t)(\cos^{n-2} t) \right) \, dt \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t)(\cos^{n-2} t) \, dt = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 t) \cos^{n-2} t \, dt \\ &= (n-1)W_{n-2} - (n-1)W_n \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout entier $n \geq 2$, $nW_n = (n-1)W_{n-2}$.

d) Posons, pour tout $n \geq 1$, $u_n = nW_nW_{n-1}$. Alors, d'après la question précédente, pour tout $n \geq 2$,

$$u_n = (nW_n)W_{n-1} = (n-1)W_{n-2}W_{n-1} = (n-1)W_{n-1}W_{n-2} = u_{n-1}$$

La suite $(u_n)_n$ est donc géométrique de raison 1 et de premier terme $u_1 = W_0W_1 = \frac{\pi}{2}$.

Par conséquent, $\boxed{\text{La suite } u_n = nW_nW_{n-1} \text{ est constante de valeur } \frac{\pi}{2}.}$

2) a) Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

$$0 \leq \cos t \leq 1$$

Donc pour tout $n \geq 0$, $\cos^n t \geq 0$ et

$$0 \leq \cos^{n+1} t \leq \cos^n t$$

En intégrant cet encadrement, il vient $W_{n+1} \leq W_n$, c'est-à-dire $\boxed{(W_n) \text{ est décroissante.}}$

Soit $n \geq 2$. D'après 1)c), $nW_n = (n-1)W_{n-2}$. Ainsi, puisque (W_n) est décroissante,

$$\frac{n-1}{n}W_{n-1} \leq \frac{n-1}{n}W_{n-2} = W_n \leq W_{n-1}$$

Puisque $W_k > 0$ d'après 1)b), il reste à diviser par W_{n-1} et constater que l'inégalité est vraie en

$n = 1$: $\boxed{\text{Pour tout } n \geq 1, \frac{n-1}{n} \leq \frac{W_n}{W_{n-1}} \leq 1.}$

b) Rappel : Pour des suites non nulles au voisinage de $+\infty$, $u_n \sim v_n \iff \lim \frac{u_n}{v_n} = 1$.

D'après 1)d), $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$ pour tout $n \geq 1$. Donc $\frac{1}{W_{n-1}} = \frac{2}{\pi}nW_n$ et l'encadrement de la question 2)a) s'écrit :

$$\frac{n-1}{n} \leq \frac{2}{\pi}nW_n^2 \leq 1$$

Donc, par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\pi}nW_n^2 = 1$, c'est-à-dire $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$ et, comme $W_n > 0$,

$$\boxed{W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.}$$

B. Formule de Stirling

1) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}\sqrt{n+1}} \frac{n^n\sqrt{n}}{n!e^n} = \frac{n^n\sqrt{n}}{(n+1)^n\sqrt{n+1}}e = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+\frac{1}{2}}e$$

Donc $\boxed{\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+\frac{1}{2}}e}$

b) Comme, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $v_n = \ln\left(\frac{u_n}{u_{n-1}}\right)$, d'après 1)a)

$$v_n = \ln\left(\left(\frac{n-1}{n}\right)^{n-\frac{1}{2}} e\right) = \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1$$

Enfinement :
$$v_n = \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1$$

Comme on ne précise pas la formule à obtenir, du moment que vous avez simplifié les factorielles et un peu débroussaillé le reste, ça va. Le but est de faciliter l'obtention du DL à la question suivante.

c) Comme le développement de $\ln(1-u)$ en 0 est $\ln(1-u) = -u - \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$, il vient :

$$\begin{aligned} v_n &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1 \\ &= \left(n - \frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) + 1 \\ &= -1 - \frac{1}{2n} - \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{4n^2} + 1 + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Conclusion :
$$v_n = -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

d) D'après la question précédente, $|v_n| \sim \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{n^2}$.

Or $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$).

Ainsi, par équivalent, la série $\sum v_n$ est absolument convergente donc convergente.

Conclusion :
$$\text{La série } \sum v_n \text{ est convergente}$$

e) La série $\sum v_n$ est télescopique : $\sum_{k=2}^n v_k = \sum_{k=2}^n (\ln u_k - \ln u_{k-1}) = \ln u_n - \ln u_1 = (\ln u_n) - 1$.

Or cette série converge, donc $(\ln u_n)_n$ converge vers $\ell \in \mathbb{R}$

Par continuité de la fonction exponentielle, $u_n = e^{\ln(u_n)}$ converge donc aussi, et sa limite est $K = e^\ell > 0$.

Comme $K > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = K$ peut s'écrire $u_n \sim K$, c'est-à-dire

$$u_n = \frac{n! e^n}{n^n \sqrt{n}} \sim K$$

La compatibilité des équivalent avec le produit nous donne

$$n! \sim K \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}$$

2) a) Montrons que la propriété :

$$\mathcal{H}(p) : W_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$$

est vraie pour tout $p \geq 0$.

- $\mathcal{H}_0$ D'après 1)b), $W_0 = \frac{\pi}{2} = \frac{0!}{(2^0 0!)^2} \frac{\pi}{2}$, donc $\mathcal{H}(0)$ est vraie.

- $\mathcal{H}_p \implies \mathcal{H}_{p+1}$: Supposons $\mathcal{H}(p)$ vraie : $W_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$. Alors

$$\begin{aligned} W_{2(p+1)} &= W_{2p+2} = \frac{2p+1}{2p+2} W_{2p} && \text{(d'après 1)c)} \\ &= \frac{2p+1}{2p+2} \times \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2} = \frac{(2p+2)(2p+1)}{(2(p+1))^2} \times \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{(2(p+1))!}{(2^{p+1}(p+1)!)^2} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{H}(p+1)$ est vraie.

- Conclusion : $\forall p \geq 0 \quad W_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2}$

D'après 1)d), pour tout $p \geq 0$, $W_{2p+1} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{(2p+1)W_{2p}}$. Ainsi

$$W_{2p+1} = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2p+1} \times \frac{(2^p p!)^2}{(2p)!} \frac{2}{\pi} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!}$$

b) D'après B.1)e),

$$p! \sim K p^p e^{-p} \sqrt{p} \quad \text{et} \quad (2p)! \sim K 2p^{2p} e^{-2p} \sqrt{2p}$$

Donc d'après B.2)a)

$$W_{2p} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \frac{\pi}{2} \sim \frac{K (2p)^{2p} e^{-2p} \sqrt{2p} \pi}{(2^p K p^p e^{-p} \sqrt{p})^2} \frac{\pi}{2} = \frac{K}{K^2} \times \frac{2^{2p}}{2^{2p}} \times \frac{p^{2p+1/2}}{p^{2p+1}} \times \frac{e^{-2p}}{e^{-2p}} \times \frac{\pi \sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2\pi}}{K} \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$$

c) D'après B.2)b), $W_{2p} \sim \frac{\sqrt{2\pi}}{K} \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$. De plus, d'après A.2)b), $W_{2p} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$.

Donc, par transitivité, $\sqrt{\frac{\pi}{4p}} \sim \frac{\sqrt{2\pi}}{K} \sqrt{\frac{\pi}{4p}}$, et ainsi $K = \sqrt{2\pi}$

En conclusion,

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

C'est ce qu'on appelle la formule de Stirling. Elle est à votre programme : le résultat est du cours.