

## Devoir de Mathématiques numéro 6

---

### Exercice 1 (INP PC 2018 – complet)

Vous avez déjà traité certaines parties de ce sujet (DST4 et 5). Pour ces questions, si vous le souhaitez, vous pouvez vous contenter d'utiliser les résultats donnés par l'énoncé.

Le but est désormais de se plonger dans un sujet « complet », de 4h, dont les parties ne sont pas indépendantes : il faut savoir réutiliser les résultats prouvés tout au long du problème.

Le sujet est constitué d'un seul problème en six parties.

**Lorsqu'un raisonnement utilise le résultat d'une question précédente, il est demandé au candidat d'indiquer précisément le numéro de la question utilisée.**

On rappelle que  $\mathbb{R}[X]$  désigne le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Pour  $n$  entier naturel,  $\mathbb{R}_n[X]$  désigne le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}[X]$  des polynômes de degré inférieur ou égal à  $n$ . On précise que l'on pourra confondre polynôme et fonction polynomiale associée.

Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$ . On note  $P^{(n)}$  sa dérivée  $n$ -ième.

On considère l'application  $\varphi$  de  $\mathbb{R}[X]$  dans lui-même définie par

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \varphi(P) = (X^2 - 1)P'' + 2XP'.$$

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $U_n = (X^2 - 1)^n$  et  $L_n = \frac{1}{2^n n!} U_n^{(n)}$ . Les polynômes  $L_n$  sont appelés *polynômes de Legendre*. Pour  $n$  entier naturel,  $a_n$  désigne le coefficient dominant de  $L_n$ .

### Partie I - Quelques résultats généraux

**Q1.** Déterminer  $L_0, L_1$  et vérifier que  $L_2 = \frac{1}{2}(3X^2 - 1)$ .

Dans la suite de cette partie,  $n$  désigne un entier naturel.

**Q2.** Justifier que  $L_n$  est de degré  $n$  et préciser la valeur de  $a_n$ .

**Q3.** Montrer que la famille  $(L_0, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

**Q4.** Pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , déterminer les racines de  $U_n$ , en précisant leur ordre de multiplicité, puis justifier qu'il existe un réel  $\alpha \in ]-1, 1[$  et un réel  $\lambda$ , que l'on ne cherchera pas à déterminer, tels que :

$$U_n' = \lambda (X - 1)^{n-1} (X + 1)^{n-1} (X - \alpha).$$

On pourra utiliser le théorème de Rolle.

**Q5.** Dans cette question seulement,  $n \geq 2$ . Soit  $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ . On suppose qu'il existe des réels  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  deux à deux distincts dans  $] -1, 1[$  et un réel  $\mu$  tels que :

$$U_n^{(k)} = \mu (X-1)^{n-k} (X+1)^{n-k} (X-\alpha_1) \dots (X-\alpha_k).$$

Justifier qu'il existe des réels  $\beta_1, \dots, \beta_{k+1}$  deux à deux distincts dans  $] -1, 1[$  et un réel  $\nu$  tels que :

$$U_n^{(k+1)} = \nu (X-1)^{n-k-1} (X+1)^{n-k-1} (X-\beta_1) \dots (X-\beta_{k+1}).$$

**Q6.** En déduire que, pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $L_n$  admet  $n$  racines réelles simples, toutes dans  $[-1, 1]$ . On les note  $x_1, \dots, x_n$ , en convenant que  $x_1 < \dots < x_n$ .

$$\text{On note } A_n = \prod_{k=1}^n (X - x_k).$$

En convenant que  $A_0 = 1$ , on a donc :  $\forall n \in \mathbb{N}, L_n = a_n A_n$ .

## Partie II - Étude des éléments propres de l'endomorphisme $\varphi$

**Q7.** Prouver que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}[X]$ .

Dans les questions **Q8** à **Q13**,  $n$  désigne un entier naturel.

**Q8.** Justifier que  $\mathbb{R}_n[X]$  est stable par  $\varphi$ .

On note  $\varphi_n$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$  induit par  $\varphi$ . Cet endomorphisme  $\varphi_n$  est donc défini par :  $\forall P \in \mathbb{R}_n[X], \varphi_n(P) = \varphi(P)$ .

**Q9.** On note  $M = (m_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$  la matrice de  $\varphi_n$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_n[X]$ . Montrer que  $M$  est triangulaire supérieure et que :  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, m_{k,k} = k(k+1)$ .

**Q10.** Montrer que  $\varphi_n$  est diagonalisable. On pourra utiliser la question **Q9**.

**Q11.** Vérifier que :  $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, (X^2 - 1) U_k' - 2kXU_k = 0$ .

**Q12.** Soit  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ . En dérivant  $(k+1)$  fois la relation de la question **Q11**, montrer grâce à la formule de dérivation de Leibniz que :  $(X^2 - 1) U_k^{(k+2)} + 2XU_k^{(k+1)} - k(k+1)U_k^{(k)} = 0$ .

**Q13.** Montrer que, pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  le polynôme  $L_k$  est un vecteur propre de  $\varphi_n$ , en précisant la valeur propre associée. On pourra utiliser la question **Q12**.

**Q14.** Déduire de ce qui précède les valeurs propres et les sous-espaces propres associés à  $\varphi$ .

Dans la suite du problème, pour  $P$  et  $Q$  de  $\mathbb{R}[X]$ , on définit :

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t) Q(t) dt.$$

## Partie III - Distance au sous-espace vectoriel $\mathbb{R}_n[X]$

**Q15.** Justifier que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est un produit scalaire sur  $\mathbb{R}[X]$ .

On note  $\|\cdot\|$  la norme associée, qui est donc définie par :  $\|f\| = \left( \int_{-1}^1 f(t)^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$ .

**Q16.** Établir que :  $\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2, \langle \varphi(P), Q \rangle = - \int_{-1}^1 (t^2 - 1) P'(t) Q'(t) dt$ , puis que :

$$\forall (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2, \langle \varphi(P), Q \rangle = \langle P, \varphi(Q) \rangle .$$

**Q17.** Montrer que la famille  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  est orthogonale pour le produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .  
On pourra utiliser la question **Q13**.

**Q18.** Montrer que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \langle P, L_n \rangle = 0$ .

**Q19.** On admet que  $\|L_n\|^2 = \frac{2}{2n+1}$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $Q_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} L_n$ . Que peut-on dire de la famille  $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  pour le produit scalaire  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ?

Dans la suite de cette partie,  $P$  désigne un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$ .

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $d(P, \mathbb{R}_n[X]) = \inf_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} \|P - Q\|$  la distance de  $P$  au sous-espace  $\mathbb{R}_n[X]$ .

**Q20.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . En utilisant un résultat de votre cours, justifier qu'il existe un unique polynôme  $T_n$  de  $\mathbb{R}_n[X]$  tel que :  $d(P, \mathbb{R}_n[X]) = \|P - T_n\|$ , puis justifier l'égalité :

$$d(P, \mathbb{R}_n[X])^2 = \|P\|^2 - \sum_{k=0}^n (c_k(P))^2, \text{ où } c_k(P) = \langle P, Q_k \rangle .$$

**Q21.** Prouver que la série  $\sum (c_k(P))^2$  converge et que :  $\sum_{k=0}^{+\infty} (c_k(P))^2 \leq \|P\|^2$ .

## Partie IV - Fonction génératrice

On admet, dans la suite du problème que  $\forall n \in \mathbb{N}^*, (n+1)L_{n+1} - (2n+1)XL_n + nL_{n-1} = 0$  et on considère la série entière de la variable  $t$  :  $\sum L_n(x)t^n$ . On note  $r$  la racine positive du polynôme  $X^2 - 2X - 1$ .

**Q22.** Montrer que :  $\forall x \in [-1, 1], \forall n \in \mathbb{N}, |L_n(x)| \leq r^n$ . On pourra raisonner par récurrence et utiliser la relation admise au début de cette partie.

**Q23.** Pour  $x \in [-1, 1]$ , on note  $R(x)$  le rayon de convergence de la série entière  $\sum L_n(x)t^n$ . Montrer que :  $R(x) \geq \frac{1}{r}$ .

**Q24.** Pour  $x \in [-1, 1]$  et  $t \in \left] -\frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right[$ , on note  $S_x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x)t^n$ . Montrer que  $S_x$  est solution sur  $\left] -\frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right[$  de l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$(1 - 2tx + t^2) y' + (t - x) y = 0 .$$

**Q25.** En déduire que :  $\forall x \in [-1, 1], \forall t \in \left] -\frac{1}{r}, \frac{1}{r} \right[ , \sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x) t^n = \frac{1}{\sqrt{t^2 - 2xt + 1}}$ .

**Q26.** Indiquer une méthode permettant, à partir du seul résultat de la question **Q25**, de retrouver l'expression des polynômes  $L_0, L_1$  et  $L_2$ .

## Partie V - Expression intégrale des polynômes de Legendre

Pour  $\theta \in [0, \pi]$  et  $n \in \mathbb{N}$ , on pose :  $w_n(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos \theta + i \sin \theta \cos u)^n du$ .

**Q27.** Soit  $t \in ]-1, 1[$ . Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on considère la fonction  $v_n$  de  $[-\pi, \pi]$  dans  $\mathbb{C}$  définie par :  $v_n(u) = t^n (\cos \theta + i \sin \theta \cos u)^n$ . Montrer que  $\sum v_n$  converge normalement sur  $[-\pi, \pi]$ .

**Q28.** Justifier l'égalité :  $\forall t \in ]-1, 1[ , \sum_{n=0}^{+\infty} w_n(\theta) t^n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{du}{1 - t \cos \theta - it \sin \theta \cos u}$ .

Dans les questions **Q29** et **Q30**,  $a$  désigne un réel strictement positif.

**Q29.** Montrer que  $\int_0^{\pi} \frac{\cos u}{1 + a^2 \cos^2 u} du = 0$ . On pourra utiliser le changement de variable défini par  $v = \pi - u$ .

**Q30.** Montrer que  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{du}{1 + a^2 \cos^2 u} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + a^2}}$ . On pourra utiliser le changement de variable défini par  $u = \text{Arctan } v$ .

**Q31.** En déduire que :

$$\forall t \in ]-1, 1[ , \forall \theta \in [0, \pi], \int_{-\pi}^{\pi} \frac{du}{1 - t \cos \theta - it \sin \theta \cos u} = \frac{2\pi}{\sqrt{t^2 - 2t \cos \theta + 1}}.$$

**Q32.** Déduire de ce qui précède que :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in [0, \pi], L_n(\cos \theta) = w_n(\theta)$ .

**Q33.** Justifier que :  $\forall x \in [-1, 1], \forall t \in ]-1, 1[ , \sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x) t^n = \frac{1}{\sqrt{t^2 - 2xt + 1}}$ .

**Q34.** Prouver que :  $\forall x \in [-1, 1], R(x) = 1$ . On pourra raisonner par l'absurde et montrer qu'alors, pour tout  $z \in \mathbb{C}$  tel que  $|z| < R(x)$ ,  $(z^2 - 2xz + 1) \left( \sum_{n=0}^{+\infty} L_n(x) z^n \right)^2 = 1$ .

## Partie VI - Application à l'approximation d'intégrales

Dans les questions **Q35** à **Q43**,  $n$  désigne un entier naturel non nul.

**Q35.** Soit  $h$  une application de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^{2n-1}$  sur  $\mathbb{R}$  telle qu'il existe  $2n$  réels  $t_1 < \dots < t_{2n}$  vérifiant :  $\forall i \in \llbracket 1, 2n \rrbracket, h(t_i) = 0$ . Montrer qu'il existe un réel  $c$  tel que :  $h^{(2n-1)}(c) = 0$ .

**Q36.** Pour  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on note  $\ell_i$  l'application linéaire définie sur  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ , à valeurs dans  $\mathbb{R}$ , par :  $\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ ,  $\ell_i(P) = P(x_i)$  (on rappelle que  $x_1, \dots, x_n$  désignent les racines de  $L_n$  et qu'elles sont deux à deux distinctes). Montrer que  $(\ell_1, \dots, \ell_n)$  est libre dans  $\mathcal{L}(\mathbb{R}_{n-1}[X], \mathbb{R})$ .

**Q37.** En déduire que pour toute application linéaire  $\psi$  de  $\mathbb{R}_{n-1}[X]$  dans  $\mathbb{R}$ , il existe un unique  $n$ -uplet  $(\beta_1, \dots, \beta_n)$  de réels tels que :  $\psi = \sum_{k=1}^n \beta_k \ell_k$ .

**Q38.** Montrer qu'il existe un unique  $n$ -uplet  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  de réels tels que :

$$\forall P \in \mathbb{R}_{n-1}[X], \int_{-1}^1 P(t) dt = \alpha_1 P(x_1) + \dots + \alpha_n P(x_n).$$

**Q39.** Montrer que la relation de la question **Q38** reste vérifiée pour tout  $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ . On pourra, pour  $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ , utiliser la division euclidienne de  $P$  par  $L_n$  et la question **Q18**.

Dans la suite du problème,  $f$  désigne une application de  $[-1, 1]$  dans  $\mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^{2n}$  sur  $[-1, 1]$ .

**Q40.** Montrer que :  $\exists! H_n \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , 
$$\begin{cases} H_n(x_i) = f(x_i) \\ H'_n(x_i) = f'(x_i) \end{cases}.$$

On pourra commencer par déterminer le noyau de l'application linéaire de  $\mathbb{R}_{2n-1}[X]$  dans  $\mathbb{R}^{2n}$  qui à  $P$  associe :  $(P(x_1), \dots, P(x_n), P'(x_1), \dots, P'(x_n))$ .

On rappelle que  $A_n$  a été défini à la question **Q6**.

**Q41.** Soit  $x \in [-1, 1]$  tel que :  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $x \neq x_i$ .  
Montrer que :  $\exists c \in [-1, 1]$ ,  $f(x) - H_n(x) = \frac{A_n(x)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(c)$ . On pourra considérer l'application  $g$  définie sur  $[-1, 1]$  par  $g(t) = f(t) - H_n(t) - \frac{A_n(t)^2}{(2n)!} K$ , où  $K$  est un réel dépendant de  $x$  à préciser, et appliquer le résultat de la question **Q35** à la fonction  $g'$ .

**Q42.** Montrer que :  $\forall y \in [-1, 1]$ ,  $\exists c \in [-1, 1]$ ,  $f(y) - H_n(y) = \frac{A_n(y)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(c)$ .

**Q43.** Justifier l'existence de  $M_{2n}(f) = \max_{t \in [-1, 1]} |f^{(2n)}(t)|$ , puis prouver que :

$$\left| \int_{-1}^1 f(t) dt - (\alpha_1 f(x_1) + \dots + \alpha_n f(x_n)) \right| \leq \frac{M_{2n}(f)}{(2n)!} \int_{-1}^1 A_n(t)^2 dt.$$

**Q44.** Déterminer un équivalent simple au voisinage de  $+\infty$  de  $\int_{-1}^1 A_n(t)^2 dt$ .