

TD n°2 : révisions pour le DS1

PTSI B Lycée Eiffel

22 septembre 2016

Exercice 1

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$
2. $x + 3\sqrt{1-x} \leq 3$
3. $|2x| - |2x+2| + |x+3| \leq 3$
4. $\ln(|x+1|) - \ln(|2x+1|) \leq \ln(2)$

Exercice 2

Le but de cet exercice est de résoudre l'équation (E) : $x^{\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$.

1. On pose $f(x) = \sqrt{x} \ln(x) + \ln(2)$. Donner le domaine de définition de f , et préciser ses limites aux bornes de ce domaine.
2. Étudier les variations de la fonction f , et dresser un tableau de variations complet de la fonction.
3. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ (on rappelle que $\ln(2) \simeq 0.69$, et $\frac{1}{e} \simeq 0.36$).
4. On va chercher les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sous la forme $x = \frac{1}{n^2}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Montrer que $f\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0 \Leftrightarrow n^2 = 2^n$.
 - (b) En déduire que n doit être pair puis, en posant $n = 2p$, que $2^{p-1} = p$.
 - (c) Trouver deux solutions évidentes à cette dernière équation, et en déduire les solutions de l'équation $f(x) = 0$.
5. Conclure en donnant toutes les solutions de l'équation (E).

Exercice 3

On définit pour tout entier naturel n la fonction f_n par $f_n(x) = x^n e^{-x^2}$. On notera \mathcal{C}_n la courbe représentative de la fonction f_n .

1. Étudier la parité de la fonction f_n (on pourra distinguer deux cas).
2. Déterminer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition, ainsi que les éventuelles asymptotes à \mathcal{C}_n .
3. Calculer la dérivée f'_1 de la fonction f_1 , puis étudier ses variations. Faire également le tableau de variations de la fonction f_2 .
4. Généraliser l'étude des variations à f_n (toujours en distinguant deux cas).

5. En notant y_n le maximum sur \mathbb{R} de la fonction f_n , déterminer la limite de y_n quand n tend vers $+\infty$. Existe-t-il un majorant commun à toutes les fonctions f_n ?
6. Déterminer la position relative de \mathcal{C}_n et \mathcal{C}_{n+1} , puis celle de \mathcal{C}_n et de \mathcal{C}_{n+2} .
7. Calculer la dérivée seconde f_1'' de la fonction f_1 , et déterminer les réels pour lesquels $f_1''(x) = 0$. Donner l'équation de la tangente à \mathcal{C}_1 en son point d'abscisse a , où a est le seul réel strictement positif vérifiant $f_1''(x) = 0$.
8. Tracer une allure des courbes \mathcal{C}_1 , \mathcal{C}_2 et \mathcal{C}_3 dans un même repère.

Problème : Un peu de géométrie !

Le but de ce problème est de déterminer la forme des triangles ayant une aire maximale à périmètre fixé.

I. Une inégalité classique.

1. Démontrer à l'aide d'une étude de fonction que, $\forall a \in [0, 1]$, $a(1-a)^2 \leq \frac{4}{27}$.
2. On fixe désormais une valeur de $a \in [0, 1]$, et on pose $f_a(x) = -ax^2 + a(1-a)x$.
 - (a) Déterminer le maximum de la fonction f_a sur l'intervalle $[0, 1-a]$.
 - (b) En déduire la propriété suivante : si a, b et c sont trois réels positifs tels que $a + b + c = 1$, alors $abc \leq \frac{1}{27}$.
 - (c) Dans quels cas l'inégalité démontrée à la question précédente est-elle une égalité ?
3. En utilisant la propriété démontrée à la question 2.b, prouver que, quels que soient les réels positifs x, y et z , on a $xyz \leq \left(\frac{x+y+z}{3}\right)^3$.
4. Montrer que l'inégalité précédente est une égalité si et seulement si $x = y = z$.

II. Applications aux triangles.

Soit $p > 0$. On considère un triangle de côtés a, b et c tels que $a + b + c = 2p$ (autrement dit, p est le demi-périmètre du triangle), et on admet que l'aire \mathcal{A} de ce triangle peut être obtenue par la formule de Héron : $\mathcal{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

1. On note $x = p - a$, $y = p - b$ et $z = p - c$, justifier que ces trois nombres sont positifs.
2. En appliquant les résultats de la première partie, déterminer la valeur maximale de \mathcal{A} (en fonction de p).
3. À quoi ressemble le triangle dans le cas où l'aire est maximale ?