

Feuille d'exercices n° 19 : séries

PTSI B Lycée Eiffel

5 mai 2020

Vrai-Faux

- Si la suite (u_n) admet une limite nulle, alors la série $\sum u_n$ converge nécessairement.
- Si la série $\sum u_n$ converge, et que $u_n = v_n + w_n$, alors $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k = \sum_{k=0}^{+\infty} v_k + \sum_{k=0}^{+\infty} w_k$.
- Si $u_n = v_{n+1} - v_n$, la série de terme général u_n a la même nature que la suite (v_n) .
- La série de terme général n^α converge si et seulement si $\alpha < -1$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{k=0}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Exercice 1 (* à ***)

Étudier la nature et calculer la somme éventuelle des séries suivantes :

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| • $\sum \frac{n-1}{3^n}$ | • $\sum \frac{n(n-1)x^n}{n!}$ | • $\sum \frac{2n^2}{n^3-1}$ |
| • $\sum \frac{1}{2^{2n+1}}$ | • $\sum \frac{4(-1)^n}{n!}$ | • $\sum \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ |
| • $\sum \frac{3+n2^n}{4^{n+2}}$ | • $\sum \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$ | • $\sum \frac{1}{4n^2-1}$ |
| • $\sum \frac{\text{ch}(n)}{3^n}$ | • $\sum \frac{5}{(2n+1)(2n+3)}$ | • $\sum \frac{1}{\sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n}}$ |
| • $\sum e^{-nx}$ | • $\sum \frac{1}{F_n}$ (F_n étant le terme d'indice n de la suite de Fibonacci) | |

Exercice 2 (**)

Soit u_n une suite définie par $u_0 > 0$ et $\forall n \geq 1, u_{n+1} = e^{-u_n} u_n$.

1. Montrer que la suite u_n est convergente et préciser sa limite.
2. En posant $v_n = \ln u_n$, calculer la somme partielle de la série de terme général u_n en fonction de v_0 et de v_{n+1} .
3. En déduire la nature de $\sum u_n$.

Exercice 3 (*)

À l'aide d'une comparaison avec une intégrale, déterminer un équivalent simple du reste d'indice n de la série de terme général $\frac{1}{n^2}$. Si on est courageux, on généralisera pour la série de terme général $\frac{1}{n^k}$.

Exercice 4 (***)

On considère une suite (u_n) définie par $u_0 \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - u_n^2$.

1. Montrer que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.
2. Déterminer la nature de la série de terme général u_n^2 et sa somme éventuelle.
3. Prouver que la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ est divergente.
4. En déduire la nature de la série $\sum u_n$.

Exercice 5 (* à **)

Étudier la nature de chacune des séries suivantes, sans chercher à calculer leur somme :

$$\begin{array}{lll} \bullet \sum \frac{1}{n^2 - n} & \bullet \sum \frac{1}{e^n + e^{-n}} & \bullet \sum \frac{1}{n^3 + 2^n} \\ \bullet \sum \ln \frac{n^2 + n^4}{2n^4} & \bullet \sum \sqrt{\frac{n+2}{n^3 - 5n + 1}} & \bullet \sum \frac{\ln n}{3^n} \\ \bullet \sum \frac{\ln(1+n)}{\ln(1+3n)} & \bullet \sum \frac{n^2}{n!} & \bullet \sum \frac{\ln(n)}{n^{\frac{3}{2}}} \\ \bullet \sum \ln \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{2n} & \bullet \sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} & \bullet \sum \frac{1}{n(\ln(n))^\alpha} \end{array}$$

Les dernières séries de l'exercice sont connues sous le nom de séries de Bertrand.

Exercice 6 (*)

En admettant que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$.

Exercice 7 (**)

1. Prouver la convergence de la série de terme général $\arctan\left(\frac{1}{n^2 + n + 1}\right)$.
2. Comparer ce terme général avec $\arctan(n+1) - \arctan(n)$.
3. En déduire la valeur de la somme de la série étudiée.

Exercice 8 (***)

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que la série de terme général $a\sqrt{n-1} + b\sqrt{n} + c\sqrt{n+1}$ soit convergente. Indice : un peu de révision de développements limités ne peut pas vous faire de mal.
2. Même question pour la série de terme général $\sqrt{n^2 + 4n + 1} - \left(an + b + \frac{c}{n}\right)$ (et même indice!).
3. Vous êtes tellement bien partis que vous allez maintenant déterminer la nature de la série de terme général $\sqrt[3]{n^3 + an} - \sqrt{n^2 + 3}$ en fonction du réel a .

Problème 1 (***)

On note dans cet exercice E l'ensemble de toutes les suites (p_n) croissantes (mais pas forcément strictement) d'entiers naturels telles que $p_0 \geq 2$. Pour une suite (p_n) appartenant à E , on s'intéresse à la série (S_n) de terme général $\frac{1}{p_0 \cdots p_n}$. Autrement dit, $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\prod_{i=0}^k p_i}$.

1. Commençons par étudier quelques cas particuliers :
 - (a) Dans le cas où la suite (p_n) est constante égale à 2, reconnaître la série (S_n) , et en déduire sa convergence, ainsi que la valeur de sa somme.
 - (b) Généraliser au cas d'une suite (p_n) constante égale à p , pour un certain entier naturel $p \geq 2$.
 - (c) Supposons désormais que $p_n = n + 2$, reconnaître à nouveau la série (S_n) , et prouver sa convergence vers une somme à déterminer. Vérifier que cette somme appartient à l'intervalle $]0, 1]$.
 - (d) En supposant désormais que $p_n = 2n + 2$, prouver que le terme général de la série (S_n) est égal à $\frac{1}{2^{n+1}(n+1)!}$, en déduire la convergence et la somme de la série (S_n) . Vérifier à nouveau que la somme appartient à $]0, 1]$.
2. Dans le cas général, prouver que la série (S_n) est toujours convergente, et que sa somme appartient à $]0, 1]$. On notera désormais $S(p)$ la somme de la série associée à la suite $p = (p_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
3. Montrer que l'application $S : E \rightarrow]0, 1]$ est une application injective (on pourra commencer par constater que, si $p_0 > q_0$, alors $S(p) < S(q)$).
4. Soit x un réel appartenant à l'intervalle $]0, 1]$. On construit à partir de x la suite (y_n) de la façon suivante : $y_0 = x$ et $\forall n \geq 1, y_{n+1} = p_n y_n - 1$, où $p_n = \text{Ent} \left(1 + \frac{1}{y_n} \right)$.
 - (a) Déterminer les premiers termes des suites (y_n) et (p_n) lorsque $x = \frac{3}{7}$ (calculez jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose de remarquable, ce qui devrait arriver vite). Calculer $S(p)$ pour la suite (p_n) ainsi obtenue.
 - (b) Dans le cas général, montrer que (y_n) est une suite décroissante d'éléments de $]0, 1]$.
 - (c) En déduire que (p_n) vérifie toujours les hypothèses posées en début d'exercice.
 - (d) Exprimer x en fonction de p_0, p_1, \dots, p_n et y_n , et en déduire la valeur de $S(p)$ lorsque $p = (p_n)$. Conclure que S est une application bijective de E dans $]0, 1]$.

Problème 2 (***)

Le but de ce problème est d'améliorer le résultat du cours sur la série harmonique (H_n) qui, rappelons-le, est définie par $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. On sait déjà que $H_n \sim \ln(n)$ (ce résultat est supposé déjà connu et donc utilisable si besoin dans ce problème), et on va désormais étudier la suite (u_n) définie par $u_n = H_n - \ln(n)$.

1. Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
2. En déduire la convergence de (u_n) vers une limite qu'on notera désormais γ (on pourra reprendre le schéma de la démonstration du cours concernant l'équivalent de la série harmonique pour minorer u_n). Montrer que $\gamma \in [0, 1]$.
3. Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur $]0, +\infty[$. Pour tout entier $k \neq 0$, on pose

$$I_k = \frac{1}{2} \int_k^{k+1} \left(t - k - \frac{1}{2} \right)^2 f''(t) dt.$$

(a) Montrer que $I_k = \frac{f'(k+1) - f'(k)}{8} - \frac{f(k+1) + f(k)}{2} + \int_k^{k+1} f(t) dt$.

(b) En déduire que $\sum_{k=1}^n f(k) = \frac{f(1) + f(n)}{2} + \frac{f'(n) - f'(1)}{8} + \int_1^n f(t) dt - \sum_{k=1}^{n-1} I_k$.

(c) On suppose désormais qu'on a posé $f(x) = \frac{1}{x}$, montrer que $0 \leq I_k \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{4t^3} dt$ pour tout $k \geq 1$.

(d) En déduire que la série $\sum I_k$ converge, puis montrer que $\sum_{k=n}^{+\infty} I_k = o\left(\frac{1}{n}\right)$.

(e) En déduire enfin que $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

4. (a) Soit $\alpha > 1$, montrer que, si $k \geq 2$, alors $\int_k^{k+1} \frac{1}{t^\alpha} dt \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{t^\alpha} dt$.

(b) En déduire que $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$.

5. Montrer que, si la série $\sum a_n$ converge, que $a_n > 0$ et $a_n \sim b_n$, alors la série $\sum b_n$ converge (ça c'est du cours) et surtout les restes sont équivalents : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} b_k$.

6. On pose désormais $x_n = u_n - \frac{1}{2n}$.

(a) Montrer que $\gamma - x_n = \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1} + 2 \ln \left(1 - \frac{1}{k} \right) \right)$.

(b) En déduire que $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$.